

Pepsane 3 g/0,004 g gel oral
dimeticonă / guaiazulen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Pepsane 3 g/ 0,004 g gel oral
dimeticonă / guaiazulen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un plic cu gel oral conține dimeticonă 3 g și guaiazulen 0,004 g.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sorbitol și parahidroxibenzoat de metil. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel oral
30 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
3 Place Renault, 92500 Rueil-Malmaison, Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12328/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pepsane este indicat în tratamentul durerilor de stomac.
Doza recomandată este de 1-2 plicuri, de 2-3 ori pe zi, înainte meselor sau când apare durerea.
Poate fi administrat pe perioada sarcinii și a alăptării.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Pepsane gel oral

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Pepsane 3 g/ 0,004 g gel oral
dimeticonă / guaiazulen

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI I CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pepsane 3 g / 0,004 g gel oral

dimeticonă / guaiazulen

Administrare orală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 g

6. ALTE INFORMAȚII

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
3 Place Renault, 92500 Rueil-Malmaison, Franța