

**Ascard 75 mg comprimate gastrorezistente
acid acetilsalicilic**

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ascard 75 mg comprimate gastrorezistente
acid acetilsalicilic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat gastrorezistent conține 75 mg acid acetilsalicilic.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate gastrorezistente
30 comprimate gastrorezistente
50 comprimate gastrorezistente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi ferit de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

ARENA GROUP S.A
Str. Ștefan Mihăileanu nr 31, cod 024022, sector 2, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13359/2020/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ascard acționează prin prevenirea formării cheagurilor de sânge și este utilizat pentru:

- reducerea riscului de infarct miocardic la pacienții cu angină pectorală sau cu factori de risc multipli, prevenirea repetării infarctului miocardic și a accidentului vascular cerebral ischemic tranzitor și infarctului cerebral;
- menținerea circulației sângelui la nivelul vaselor de sânge ale inimii după anumite intervenții chirurgicale.

Nu luați Ascard (sau întrebați medicul înainte de a lua) dacă:

- sunteți alergic la acidul acetilsalicilic, la alți salicilați sau la oricare dintre celelalte componente ale Ascard;
- ați avut astm bronșic legat de utilizarea salicilaților sau a substanțelor înrudite, în special antiinflamatoare nesteroidiene;
- ați prezentat tulburări de coagulare a sângelui sau aveți afecțiuni cu risc crescut de hemoragii;
- aveți ulcer la nivelul stomacului sau intestinului subțire;
- dacă utilizați Ascard concomitent cu metotrexat în doze ≥ 15 mg/săptămână;
- sunteți în ultimul trimestru de sarcină.
- ați avut boli renale sau aveți insuficiență hepatică sau cardiacă severă, aveți deficit (de la naștere) de glucozo - 6 - fosfat - dehidrogenază (o enzimă) sau alăptați.

Pentru prevenirea afecțiunilor de la nivelul vaselor inimii se recomandă un comprimat Ascard 75 mg de 1 - 4 ori pe zi.

Pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale ischemice tranzitorii și a infarctului cerebral se recomandă un comprimat Ascard 75 mg de 1 - 2 ori pe zi.

A nu se depăși doza și durata recomandate pentru tratament.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Ascard 75 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 13359/2020/01-02

Anexa 3

Informații privind etichetarea

**Ascard 75 mg comprimate gastrorezistente
acid acetilsalicilic**

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ascard 75 mg comprimate gastrorezistente
acid acetilsalicilic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{ARENA GROUP S.A}

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII