

ACC cu aromă de mure 600 mg pulbere orală în plic
Acetilcisteină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie pentru plic din Al/hârtie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ACC cu aromă de mure 600 mg pulbere orală în plic

acetilcisteină

Pentru fluidificarea mucusului în tractul respirator.

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic conține acetilcisteină 600 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține aspartam și sorbitol.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere orală

8 plicuri
10 plicuri
14 plicuri
20 plicuri
30 plicuri
60 plicuri
90 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A nu se mesteca.

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrație orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Sandoz Pharmaceuticals S.R.L.
Calea Floreasca, nr. 169A
Clădirea A, etaj 1, sector 1, 014459,
București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14806/2022/01 – ambalaj cu 8 plicuri
14806/2022/02 – ambalaj cu 10 plicuri
14806/2022/03 – ambalaj cu 14 plicuri
14806/2022/04 – ambalaj cu 20 plicuri
14806/2022/05 – ambalaj cu 30 plicuri
14806/2022/06 – ambalaj cu 60 plicuri
14806/2022/07 – ambalaj cu 90 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru adulți.

A nu se utiliza de copiii cu vârsta mai mică de 2 ani.

ACC cu aromă de mure 600 mg pulbere orală în plic este folosit pentru **a fluidifica mucusul** și pentru **a facilita tusea** în cazul afecțiunilor respiratorii cu **mucus vâscos**.

Dacă nu este altfel prescris de către medicul dumneavoastră, doza recomandată este de 1 plic o dată pe zi.

Mod de utilizare

ACC cu aromă de mure 600 mg pulbere orală în plic trebuie pus direct pe limbă. Pulberea stimulează salivarea și, prin urmare, poate fi înghițită ușor.

A se nota că pulberea orală nu trebuie mestecată înainte de înghițire. Pulberea poate fi luată fără apă.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ACC cu aromă de mure 600 mg pulbere orală în plic

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu se aplică

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu se aplică

ACC cu aromă de mure 600 mg pulbere orală în plic
Acetilcisteină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****Plic din Al/hârtie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

ACC cu aromă de mure 600 mg pulbere orală în plic

acetilcisteină

Administrare orală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A nu se mesteca.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1,6 g

6. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru adulți.

A nu se utiliza de copiii cu vârsta mai mică de 2 ani.