

Relinex 8,75 mg pastile
flurbiprofen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relinex 8,75 mg pastile

flurbiprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține flurbiprofen 8,75 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: isomalt (E 953), maltitol lichid (E 965), macrogol 300, ulei de mentă (conține d-limonen), aromă de lămâie (conține d-limonen, geraniol și citral) și aromă de miere (conține propilenglicol).

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă

8 pastile

12 pastile

16 pastile

20 pastile

24 pastile

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Deținătorul autorizației de punere pe piață:

Gemax Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praga 1
Republica Cehă

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

APP nr.:

16489/2026/01 – ambalaj cu 8 pastile
16489/2026/02 – ambalaj cu 12 pastile
16489/2026/03 – ambalaj cu 16 pastile
16489/2026/04 – ambalaj cu 20 pastile
16489/2026/05 – ambalaj cu 24 pastile

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICAREA GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru ameliorarea durerii în gât și a inflamației de la nivelul gâtului.

Pentru ameliorarea locală, pe termen scurt, a simptomelor de durere în gât, inclusiv disconfort la nivelul gâtului, durere și inflamație și dificultăți la înghițire. Medicamentul este indicat pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani.

Doze:

Sugeți o pastilă la interval de 3-6 ore, la nevoie.

Nu utilizați mai mult de 5 pastile în interval de 24 ore. Nu utilizați mai mult de 3 zile.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

relinex

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Relinex 8,75 mg pastile
flurbiprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relinex 8,75 mg pastile

flurbiprofen

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Gemax Pharma s.r.o.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII