

Septerloz Mentă 3 mg/1 mg pastile
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Septerloz Mentă 3 mg/1 mg pastile
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține clorhidrat de benzidamină 3 mg și clorură de cetilpiridiniu 1 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: izomalt (E 953), maltitol lichid (E 965), acid citric monohidrat, levomentol, acesulfam de potasiu (E 950), ulei de mentă.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă
8 pastile
10 pastile
12 pastile
16 pastile
24 pastile
36 pastile

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Geiser Pharma S.L.
Polígono Mutilva Calle E, 5 Bajo, Mutilva (Navarra), 31192
Spania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16562/2026/01-06

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Septerloz Mentă 3 mg/1 mg pastile este indicat pentru tratamentul antiinflamator, analgezic și antiseptic al iritațiilor gâtului, cavității bucale și gingiilor, în gingivită și faringită.
Septerloz Mentă 3 mg/1 mg pastile dezinfectează cavitatea bucală și gâtul și reduce semnele inflamației gâtului, cum sunt durerea, eritemul, edemul, creșterea temperaturii și disfuncției locale

Doze:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani: 3–4 pastile pe zi. Pastila trebuie dizolvată încet în cavitatea bucală, la intervale de 3 până la 6 ore.

Copii cu vârsta de 6 până la 12 ani: 3 pastile pe zi. Pastila trebuie dizolvată încet în cavitatea bucală, la intervale de 3 până la 6 ore.

Septerloz Mentă este contraindicat la copiii cu vârsta sub 6 ani.

Nu utilizați acest medicament pe o perioadă mai mare de 7 zile. Dacă simptomele se agravează sau nu se ameliorează după 3 zile, sau dacă apar alte simptome, cum ar fi febra, adresați-vă medicului.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Septerloz Mentă 3 mg/1 mg pastile

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Septerloz Mentă 3 mg/1 mg pastile
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ
BLISTER**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Septerloz Mentă 3 mg/1 mg pastile
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Geiser Pharma S.L.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII