

**PROTECARDIN 100 mg comprimate gastrorezistente**  
acid acetilsalicilic

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

PROTECARDIN 100 mg comprimate gastrorezistente  
acid acetilsalicilic

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat gastrorezistent conține acid acetilsalicilic 100 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și lactoză monohidrat. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimate gastrorezistente.  
40 comprimate gastrorezistente

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperatura sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi ferit de umiditate.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BIOFARM S.A.  
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România

{Sigla BIOFARM}

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

16584/2026/01-02

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

PROTECARDIN este utilizat pentru:

- prevenirea reapariției infarctului miocardic și a accidentului vascular cerebral ischemic, inclusiv a atacurilor ischemice tranzitorii;
- reducerea riscului de infarct miocardic la pacienții cu angină pectorală sau cu factori de risc multipli, cum sunt: hipertensiune arterială, creștere ale valorii lipidelor din sânge (hipercolesterolemie), fumat, diabet zaharat și obezitate;
- prevenirea formării cheagurilor de sânge după anumite intervenții chirurgicale (plastie vasculara și șunt coronarian).

Nu luați PROTECARDIN 100 mg (sau întrebați medicul înainte de a lua) dacă:

- sunteți alergic la acidul acetilsalicilic, la alți salicilați sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului;
- ați avut astm bronșic legat de utilizarea salicilaților sau a substanțelor înrudite, în special antiinflamatoare nesteroidiene;
- ați prezentat tulburări de coagulare a sângelui sau aveți afecțiuni cu risc crescut de hemoragii;
- aveți ulcer la nivelul stomacului sau intestinului subțire;
- utilizați PROTECARDIN® 100 mg concomitent cu metotrexat în doze  $\geq 15$  mg/saptamână;
- sunteți în ultimul trimestru de sarcină sau alăptați;
- aveți insuficiență renală, hepatică sau cardiacă severă;
- aveți deficit (de la naștere) de glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

PROTECARDIN 100 mg

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**PROTECARDIN 100 mg comprimate gastrorezistente**  
acid acetilsalicilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**Blister**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

PROTECARDIN 100 mg comprimate gastrorezistente  
acid acetilsalicilic

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

{ Biofarm S.A. }

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. ALTE INFORMAȚII**