Paracetamol Sopharma500 mg comprimate
Paracetamol

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Paracetamol Sopharma 500 mg comprimate
Paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține și lactoză monohidrat și amidon din grâu. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimate

20 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sopharma AD
Iliensko Shosse 16
1220 Sofia,
Bulgaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

16967/2026/01

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul durerii şi/sau febrei de intensitate uşoară până la moderată.

Atenţionare: utilizarea unor doze mai mari decât cele recomandate poate determina o afectare gravă a ficatului. Nu trebuie să utilizaţi Paracetamol Sopharma fără a cere sfatul medicului dacă aveţi probleme legate de consumul de alcool etilic, afectare a ficatului sau dacă luaţi deja medicamente analgezice care conţin paracetamol.

Adulţi şi adolescenţi cu greutate peste 50 kg

Doza uzuală este de 1 sau 2 comprimate la interval de 4 până la 6 ore dacă este necesar, până la o doză maximă de 6 comprimate zilnic.

Copii şi adolescenţi cu greutate cuprinsă între 43- 50 kg
Doza uzuală este de 1 comprimat, la interval de 4 ore, dacă este necesar, până la o doză maximă de 5 comprimate zilnic.

Copii cu greutate cuprinsă între 34- 43 kg
Doza uzuală este de 1 comprimat, la interval de 6 ore, dacă este necesar, până la o doză maximă de 4 comprimate zilnic.

Copii cu greutate cuprinsă între 26 - 34 kg
Doza uzuală este de o jumătate de comprimat la interval de 4 ore sau de 1 comprimat la interval de 6 ore, dacă este necesar, până la o doză maximă de 3 comprimate zilnic.

Paracetamol Sopharma 500 mg comprimate filmate nu este indicat la copii cu greutate mai mică de 26 kg.

În caz de febră mare sau de semne de infecţie după mai mult de 3 zile de tratament sau dacă durerea persistă după mai mult de 5 zile de tratament, trebuie să vă adresaţi unui medic.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Paracetamol Sopharma 500 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Paracetamol Sopharma 500 mg comprimate
Paracetamol

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Paracetamol Sopharma 500 mg comprimate
Paracetamol

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sopharma AD

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII