

Nurofen Răceală și Gripă 200 mg/30 mg comprimate filmate
Ibuprofen/Clorhidrat de pseudoefedrină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Nurofen Răceală și Gripă 200 mg/30 mg comprimate filmate
Ibuprofen/Clorhidrat de pseudoefedrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat filmat conține ibuprofen 200 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sodiu și galben amurg FCF (E 110). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate filmate
12 comprimate filmate
24 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11
Sectorul 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

4144/2011/01- ambalaj cu 12 comprimate filmate
4144/2011/02- ambalaj cu 24 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Febră

Congestie nazală

Durere în gât

Durere de cap

Nurofen Răceală și Gripă conține ibuprofen (pentru ameliorarea durerii, inflamației și scăderea temperaturii în caz de febră) și clorhidrat de pseudoefedrină (un decongestionant pentru scăderea edemului mucoasei tractului respirator superior și scăderea secreției nazale).

Nurofen Răceală și Gripă scade edemul mucoasei căilor respiratorii și sinusurilor, scade secreția nazală, scade temperatura în caz de febră, ameliorează durerile, inclusiv durerea de cap și disconfortul faringian fără a determina somnolență.

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani (≥ 40 kg): doza inițială este de 1-2 comprimate filmate Nurofen Răceală și Gripă; ulterior, dacă este cazul, pot fi utilizate doze suplimentare de 1-2 comprimate filmate la fiecare 4-6 ore. Nu trebuie depășită o doză zilnică de 6 comprimate filmate.

Trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră dacă simptomele se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 3 zile în cazul în care aveți febră și după 4 zile în cazul calmării durerilor.

Ameliorează simptomele de gripă și răceală.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Nurofen Răceală și Gripă

Nurofen Răceală și Gripă 200 mg/30 mg comprimate filmate
Ibuprofen/Clorhidrat de pseudoefedrină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nurofen Răceală și Gripă 200 mg/30 mg comprimate filmate
Ibuprofen/Clorhidrat de pseudoefedrină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII