

**DICLAC 50 mg/g, gel**  
Diclofenac sodic

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR**

**CUTIE ȘI TUB**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

DICLAC 50 mg/g, gel  
Diclofenac sodic

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un gram gel conține diclofenac sodic 50 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Alcool izopropilic, cocoat de macrogol-7-glicerol, hipromeloză, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Gel

Un tub a 50 g gel

Un tub a 100 g gel

Un tub a 150 g gel

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

HEXAL AG

Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Germania

{Sigla SANDOZ}

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

837/2008/01- {pentru cutia cu un tub a 50 g gel}

837/2008/02- {pentru cutia cu un tub a 100 g gel}

837/2008/03- {pentru cutia cu un tub a 150 g gel}

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****Pentru ce se utilizează Diclac 50 mg/g, gel:**

Diclac este utilizat în tratamentul simptomatic al:

- durerilor în cazul formelor localizate ale reumatismului degenerativ, cum sunt: artroze ale articulațiilor mici și genunchiului;
- durerilor musculare sau osteoarticulare de natură traumatică (traumatisme ale tendoanelor, ligamentelor, mușchilor și articulațiilor, cum sunt: luxații, entorse, echimoze, dureri lombare);
- durerilor, inflamației și umflăturilor în cazul formelor localizate ale reumatismului abarticlar: tendinită, bursită, sindromul umăr-mână și periartrită.

**Cum să utilizați Diclac 50 mg/g, gel:**

Diclac se administrează în strat subțire, în 2-3 aplicații pe zi, la nivelul zonei afectate.

Diclac poate fi aplicat în asociere cu iontoforeza. Această formă de electroterapie crește pătrunderea în piele, dacă gelul este aplicat la polul negativ (catod).

Antialgic, antiinflamator

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

*{Doar pentru cutie}*

DICLAC 50 mg/g, gel

#### **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

*Nu se aplică.*

#### **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

*Nu se aplică.*