

**Fervex durere și febră pentru copii 30 mg/ml soluție orală  
paracetamol****INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI PRIMAR  
CUTIE DE CARTON ȘI ETICHETA DE FLACON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Fervex durere și febră pentru copii 30 mg/ml soluție orală  
paracetamol

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE**

Fiecare ml de soluție orală conține paracetamol 30 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR****Cutie:**

Excipienți cu efect cunoscut: sucroză și propilenglicol (E1520) în aromă.  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Soluție orală cu seringă dozatoare  
Aromă de căpșuni  
Flacon de 90 ml cu sistem de dozare (seringă pentru dozare orală).  
Flacon de 150 ml cu sistem de dozare (seringă pentru dozare orală).

**5. MODUL ȘI CALEA DE ADMINISTRARE**

Administrare orală  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE  
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

## **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

### **Cutie:**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. A se păstra în ambalajul original.  
Soluția orală trebuie utilizată în maxim 6 luni după prima deschidere.

### **Flacon:**

Soluția orală trebuie utilizată în maxim 6 luni după prima deschidere.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

## **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

### **Cutie**

UPSA SAS  
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Franța

### **Flacon**

UPSA SAS, Franța

## **12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

8837/2016/01-02

## **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

## **14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

### **Cutie**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

### **Cutie**

Alină durerea și febra

Fervex durere și febră pentru copii este indicat în tratamentul simptomatic al febrei și/sau durerilor, cum ar fi dureri de cap, răceală, dureri de dinți, dureri musculare.

Doza zilnică maximă de paracetamol nu trebuie să depășească 60 mg/kg. Intervalul minim dintre administrări este de 4 până la 6 ore.

Fervex durere și febră pentru copii 30 mg/ml trebuie administrat de la 10 la 15 mg/kg/doză, la fiecare 4 - 6 ore, până la o doză totală zilnică maximă de 60 mg/kg pe zi.

Acest medicament este destinat copiilor cu greutatea corporală de la 3 la 32 kg (aproximativ de la naștere până la vârsta de 12 ani). Doza trebuie stabilită în funcție de greutatea copilului. Gradațiile de pe seringă dozatoare arată dozajul medicamentului în funcție de greutatea copilului. Utilizarea sistemului de dozare

este strict destinată pentru administrarea de Fervex durere și febră pentru copii 30 mg/ml, soluție orală. Pentru copiii care au alte greutăți sunt disponibile alte forme de paracetamol pentru care trebuie să vă adresați medicului sau farmacistului.

Soluția poate fi băută ca atare sau diluată într-o cantitate mică de lichid (de exemplu: apă, lapte, suc de fructe).

Se apasă și se învâрте capacul pentru a deschide flaconul.

După fiecare utilizare, închideți flaconul cu soluție orală, curățați și uscați seringă și păstrați-o în cutie cu flaconul și prospectul.

A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.

#### **Flacon**

Acest medicament este destinat copiilor cu greutatea corporală de la 3 la 32 kg (aproximativ de la naștere până la vârsta de 12 ani). Doza trebuie stabilită în funcție de greutatea copilului. Gradațiile de pe seringă dozatoare arată dozajul medicamentului în funcție de greutatea copilului.

Pentru copiii care au alte greutăți, sunt disponibile alte forme de paracetamol pentru care trebuie să vă adresați medicului sau farmacistului.

Soluția poate fi băută ca atare sau diluată într-o cantitate mică de lichid (de exemplu: apă, lapte, suc de fructe).

Se apasă și se învâрте capacul pentru a deschide flaconul.

După fiecare utilizare, închideți flaconul cu soluție orală.

### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

#### **Cutie:**

fervex durere și febră pentru copii 30 mg/ml

### **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

<Nu este cazul.>

### **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

<Nu este cazul.>