

Gaviscon Mentol suspensie orală în plic
Alginat de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu și carbonat de calciu

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Gaviscon Mentol suspensie orală în plic

Alginat de sodiu

Hidrogenocarbonat de sodiu

Carbonat de calciu

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare 10 ml conțin alginat de sodiu 500 mg, hidrogenocarbonat de sodiu 267 mg și carbonat de calciu 160 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține parahidroxibenzoat de metil (E 218) și parahidroxibenzoat de propil (E 216) care pot provoca reacții alergice (chiar întârziate).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

10 ml

2 plicuri

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 plicuri.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Dacă simptomele persistă după 7 zile de utilizare, adresați-vă medicului dumneavoastră. Conține sodiu și calciu. Dacă vi s-a recomandat să urmați o dietă restrictivă privind vreuna dintre aceste săruri, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Conținut crescut de sodiu – consultați prospectul pentru mai multe informații.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.
Strada Grigore Alexandrescu Nr. 89-97, Corpul A, etaj 5,
Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Ambalaj cu 2 plicuri: 9077/2016/01
Ambalaj cu 4 plicuri: 9077/2016/02
Ambalaj cu 6 plicuri: 9077/2016/03
Ambalaj cu 8 plicuri: 9077/2016/04
Ambalaj cu 10 plicuri: 9077/2016/05
Ambalaj cu 12 plicuri: 9077/2016/06
Ambalaj cu 14 plicuri: 9077/2016/07
Ambalaj cu 16 plicuri: 9077/2016/08
Ambalaj cu 18 plicuri: 9077/2016/09
Ambalaj cu 20 plicuri: 9077/2016/10
Ambalaj cu 22 plicuri: 9077/2016/11
Ambalaj cu 24 plicuri: 9077/2016/12
Ambalaj cu 26 plicuri: 9077/2016/13
Ambalaj cu 28 plicuri: 9077/2016/14
Ambalaj cu 30 plicuri: 9077/2016/15
Ambalaj cu 32 plicuri: 9077/2016/16
Ambalaj cu 36 plicuri: 9077/2016/17

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratamentul simptomelor refluxului gastro-esofagian

- indigestie
- regurgitație acidă
- arsuri în capul pieptului

Adulți, inclusiv vârstnici și adolescenți cu vârsta de 12 ani și mai mari: unul până la două plicuri după masă și la culcare sau conform recomandărilor (maxim de patru ori pe zi). Copii și adolescenți cu vârsta sub 12 ani: trebuie administrat numai la sfatul medicului.

[Pictograme mod de administrare]



Rupeți

Strângeți

Luați

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Gaviscon Mentol suspensie orală în plic

Gaviscon Mentol suspensie orală în plic
Alginat de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu și carbonat de calciu

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
PLIC**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Gaviscon Mentol suspensie orală în plic

Alginat de sodiu
Hidrogenocarbonat de sodiu
Carbonat de calciu

Suspensie orală în plic

2. MODUL DE ADMINISTRARE

/Pictograme mod de administrare/



Rupeți

Strângeți

Luați

Administrare orală

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATE DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAȚII