

Maresyl 0,5 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutia de carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Maresyl 0,5 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 ml de spray nazal conține clorhidrat de xilometazolină 0,5 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și apă de mare purificată, dihidrogenofosfat de potasiu, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray nazal, soluție
1 x 10 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare nazală.
Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 10 ani.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:
Flacon deschis: a se utiliza în decurs de 3 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. A nu se congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Dr. Reddy's Laboratories Romania SRL
Str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, etaj 5, spațiul 1, sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9369/2016/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Maresyl este utilizat pentru tratamentul simptomatic al congestiei nazale.
1 pulverizare în fiecare nară, la interval de 10-12 ore. Dacă este necesar, medicamentul poate fi utilizat de cel mult 3 ori pe zi.
Pentru detalii suplimentare, citiți prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Maresyl 0,5 mg/ml spray nazal, soluție

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Maresyl 0,5 mg/ml spray nazal soluție
Clorhidrat de xilometazolină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Maresyl 0,5 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină
Administrare nazală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

1 pulverizare în fiecare nară, la interval de 10-12 ore. Dacă este necesar, medicamentul poate fi utilizat de cel mult 3 ori pe zi.
Pentru detalii suplimentare, citiți prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:
Flacon deschis: a se utiliza în decurs de 3 luni.

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Maresyl este utilizat pentru tratamentul simptomatic al congestiei nazale.

1 ml de spray nasal conține clorhidrat de xilometazolină 0,5 mg.

Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 10 ani.