

AMBROXOL-RICHTER 30 mg/5 ml sirop
clorhidrat de ambroxol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

AMBROXOL-RICHTER 30 mg/5 ml sirop
clorhidrat de ambroxol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un mililitru sirop conține clorhidrat de ambroxol 6 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sorbitol (E 420). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Sirop**

Un flacon a 100 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Gedeon Richter România S.A.
Str. Cuza Vodă Nr. 99-105
540306 Târgu-Mureș, România

{Sigla GEDEON RICHTER}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9749/2017/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mucolitic

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 5 ml Ambroxol-Richter 30 mg/5 ml de 2-3 ori pe zi în primele 2-3 zile, apoi 5 ml Ambroxol-Richter 30 mg/5 ml de 2 ori pe zi sau 2,5 ml Ambroxol-Richter 30 mg/5 ml de 3 ori pe zi.

În cazul în care este necesară creșterea eficienței, doza pentru adulți se poate crește până la 10 ml Ambroxol-Richter 30 mg/5 ml de 2 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani: 2,5 ml Ambroxol-Richter 30 mg/5 ml de 2-3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2-5 ani: 1,25 ml Ambroxol-Richter 30 mg/5 ml de 3 ori pe zi.

Copii sub 2 ani: 1,25 ml Ambroxol-Richter 30 mg/5 ml de 2 ori pe zi.

O linguriță dozatoare cu capacitatea de 2,5 ml conține 15 mg clorhidrat de ambroxol, iar cea cu capacitatea de 5 ml conține 30 mg clorhidrat de ambroxol.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ambroxol-richter 30 mg/5 ml sirop

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:
SN:
NN:

AMBROXOL-RICHTER 30 mg/5 ml sirop
clorhidrat de ambroxol

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon a 100 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

AMBROXOL-RICHTER 30 mg/5 ml sirop
clorhidrat de ambroxol

Administrare orală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Un mililitru sirop conține clorhidrat de ambroxol 6 mg.
Conține și sorbitol.

100 ml

6. ALTE INFORMAȚII

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

{Sigla GEDEON RICHTER}