

THERAFLU SINUS RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 650mg/10mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

THERAFLU SINUS RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 650mg/10mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/ Clorhidrat de fenilefrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un plic Theraflu Sinus răceală și gripă conține paracetamol 650 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr 12,6 g, Sunset yellow FCF (E 110), sodiu.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție orală
14,875 g pulbere pentru soluție orală.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6
Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9763/2017/01 – {pentru ambalajul cu 6 plicuri a câte 14,875 g pulbere pentru soluție orală}
9763/2017/02 – {pentru ambalajul cu 10 plicuri a câte 14,875 g pulbere pentru soluție orală}
9763/2017/03 – {pentru ambalajul cu 14 plicuri a câte 14,875 g pulbere pentru soluție orală}
9763/2017/04 – {pentru ambalajul cu 20 plicuri a câte 14,875 g pulbere pentru soluție orală}

13. SERIA DE FABRICAȚIE<, CODURILE DONAȚIEI ȘI MEDICAMENTULUI>

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Recomandat în tratamentul simptomelor majore asociate răcelii și gripei, inclusiv:

- febră și frisoane
- dureri musculare și articulare
- dureri de cap

- congestie nazală

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: un plic la fiecare 4-6 ore după cum este necesar, fără a se depăși 3-4 picuri pe zi. Utilizarea nu trebuie să depășească 5 zile.

Conținutul unui plic se dizolvă în aproximativ 250 ml de apă fierbinte , dar nu clocotită. A se bea cald.

Aromă de lamâie

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Theraflu Sinus răceală și gripă

THERAFLU SINUS RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 650mg/10mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

Plic unidoză din PET/PEJD/Al/EMAA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

THERAFLU SINUS RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 650mg/10mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE<, CODURILE DONAȚIEI ȘI MEDICAMENTULUI>

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Conține 14,875 g pulbere pentru soluție orală.

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani:

Luați un plic la fiecare 4 până la 6 ore, după cum e nevoie, până la 3-4 plicuri pe zi.

Nu utilizați mai mult de 5 zile. Dacă simptomele persistă mai mult de 5 zile sau se agravează sau dacă febra persistă mai mult de 3 zile, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Conținutul unui plic se dizolvă în aproximativ 250 ml de apă fierbinte , dar nu clocotită. A se bea cald.

Conține zahăr, sunset yellow, sodiu.