

ACC 200 mg pulbere pentru soluție orală

Acetilcisteină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIACC 200 mg pulbere pentru soluție orală
Acetilcisteină**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un plic unidoză (3 g) conține acetilcisteină 200 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILORConține și zahăr
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Pulbere pentru soluție orală
20 plicuri unidoză**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Atenționare pentru pacienții cu diabet zaharat: 3 g (1 plic) pulbere pentru soluție orală conțin carbohidrați 0,23 unități de pâine (2,717 g zahăr)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30° C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

HEXAL AG, Industriestrasse 25,
D-83607 Holzkirchen, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1240/2008/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ACC 200 mg pulbere pentru soluție orală fluidifică mucusul vâscos în cazul afecțiunilor tractului respirator: laringită, sinuzită acută și cronică, otită medie.

ACC 200 pulbere pentru soluție orală facilitează tusea și expectorația secrețiilor în cazul afecțiunilor respiratorii acute și cronice acompaniate de tulburări în formarea și transportul mucusului: bronșită acută, bronșită astmatiformă, în acutizările bronho-pneumopatiei cronice, bronșiectazii, mucoviscidoză, astm bronșic.

Dacă nu este altfel prescris, sunt recomandate următoarele doze zilnice:

Copii cu vârsta sub 2 ani:

Administrați ACC 200 mg pulbere pentru soluție orală la copii cu vârsta sub 2 ani numai la recomandarea medicului, deoarece nu există suficientă experiență cu privire la administrarea acetilcisteinei la acest grup de vârstă

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani:

Se recomandă administrarea formelor farmaceutice cu concentrații adecvate.

Copii și adolescenți cu vârsta între 6-14 ani

Un plic de 2 ori pe zi (echivalent cu 400 mg acetilcisteină)

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani

Un plic de 2-3 ori pe zi (echivalent cu 400-600 mg acetilcisteină)

Mod de administrare și durata administrării

ACC 200 mg pulbere pentru soluție orală se administrează după mese.

Vă rugăm să dizolvați pulberea într-un pahar cu apă și să beți în totalitate conținutul paharului.

Dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau nu se ameliorează după 4-5 zile, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră.

În cazul bronșitei cronice și al mucoviscidozei tratamentul trebuie continuat pe o perioadă mai lungă de timp pentru a realiza profilaxia infecției.

| |
|----------------------------------|
| 16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE |
|----------------------------------|

ACC 200 mg pulbere pentru soluție orală

ACC 200 mg pulbere pentru soluție orală
Acetilcisteină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

ACC 200 mg pulbere pentru soluție orală
Acetilcisteină
Uz oral

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

200 mg

6. ALTE INFORMAȚII

{Sigla Sandoz}