

ASPIRIN ANTIGRIP HOT 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală
acid acetilsalicilic/clorhidrat de pseudoefedrină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIASPIRIN ANTIGRIP HOT 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală
acid acetilsalicilic/clorhidrat de pseudoefedrină**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține acid acetilsalicilic 500 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr și alcool benzilic. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule pentru suspensie orală.

10 plicuri

20 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu utilizați împreună cu alte analgezice și simpatomimetice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BAYER S.R.L.
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681, București
România

{sigla Bayer}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12605/2019/01 - cutie cu 10 plicuri
12605/2019/02 - cutie cu 20 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomelor de răceală și/sau manifestărilor asemănătoare gripei însoțite de congestie nazală/sinusală, durere și febră.

Dacă nu se prescrie altfel, la adulți se recomandă: 1-2 plicuri, pentru o doză. Doza zilnică nu trebuie să depășească 6 plicuri.

ASPIRIN ANTIGRIP HOT este destinat utilizării la adulți și adolescenți cu vârsta peste 16 ani și nu se administrează copiilor cu vârsta sub 16 ani, cu excepția cazului în care medicul recomandă acest lucru. Dizolvați granulele într-un pahar cu apă rece sau fierbinte (dar nu clocotită) și agitați bine înainte de administrare. Gust de portocală.

Nu luați acest medicament mai mult de 3 zile fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

aspirin antigrip hot

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

ASPIRIN ANTIGRIP HOT 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală
acid acetilsalicilic/clorhidrat de pseudoefedrină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**
Plic**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ASPIRIN ANTIGRIP HOT 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală
acid acetilsalicilic/clorhidrat de pseudoefedrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic conține acid acetilsalicilic 500 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr și alcool benzilic.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule pentru suspensie orală.
500 mg/30 mg

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BAYER S.R.L.
{sigla Bayer}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12605/2019/01 – parte a unui ambalaj cu 10 plicuri
12605/2019/02 – parte a unui ambalaj cu 20 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomelor de răceală și/sau manifestărilor asemănătoare gripei însoțite de congestie nazală/sinusală, durere și febră.

Adulți: 1-2 plicuri, pentru o doză. Doza zilnică nu trebuie să depășească 6 plicuri.

Dizolvați granulele într-un pahar cu apă rece sau fierbinte (dar nu clocotită) și agitați bine. Preparatul fierbinte trebuie administrat numai după răcire la o temperatură adecvată de băut.

Nu luați acest medicament mai mult de 3 zile fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

A se citi prospectul înainte de utilizare.