

Ambroxol AL 7,5 mg/ml, picături orale soluție
Clorhidrat de ambroxol**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR****CUTIE ȘI ETICHETĂ DE FLACON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Ambroxol AL 7,5 mg/ml, picături orale soluție
Clorhidrat de ambroxol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un ml picături orale, soluție conține clorhidrat de ambroxol 7,5 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sorbitol (E 420), metabisulfid de sodiu (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături orale, soluție

{Cutie}

Un flacon a 50 ml picături orale, soluție și o măsură dozatoare, gradată la 1, 1,5, 2, 3, 4, 5 și 6 ml

{Eticheta de flacon}

50 ml

Un flacon a 100 ml picături orale, soluție și o măsură dozatoare, gradată la 1, 1,5, 2, 3, 4, 5 și 6 ml

{Eticheta de flacon}

100 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se utiliza în maxim 3 luni după prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1906/2009/01

1906/2009/02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru ce se utilizează Ambroxol AL:

Ambroxol AL este un medicament care elimină mucusul, fiind utilizat în boli pulmonare și ale bronhiilor în care se formează mucus vâcos.

Cum să utilizați Ambroxol AL:

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 – 12 ani: 2 ml picături orale, soluție (15 mg clorhidrat de ambroxol) de 2–3 ori pe zi, în funcție de gravitatea afecțiunii.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 – 6 ani: un ml picături orale, soluție (7,5 mg clorhidrat de ambroxol) de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 1 – 2 ani: un ml picături orale, soluție (7,5 mg clorhidrat de ambroxol) de 2 ori pe zi.

Adulți și adolescenți: 4 ml picături orale, soluție (30 mg clorhidrat de ambroxol) de 3 ori pe zi în primele 2-3 zile, ulterior 4 ml picături orale, soluție (30 mg clorhidrat de ambroxol) de 2 ori pe zi. Pentru adulți, la nevoie dozele pot fi crescute până la 8 ml picături orale, soluție (60 mg clorhidrat de ambroxol) de 2 ori pe zi.

Ambroxol Al 7,5 mg/ml, picături orale, soluție trebuie administrat în timpul meselor.

Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 4 - 5 zile.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Ambroxol AL 7,5 mg/ml} - numai pentru cutie

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

Nu este cazul.