

**MASTODYNON picături orale soluție****INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Mastodynon picături orale soluție

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un ml picături orale soluție conține:

<i>Vitex agnus castus</i> D1	185,0 mg
<i>Caulophyllum thalictroides</i> D 4	92,5 mg
<i>Cyclamen purpurascens</i> D 4	92,5 mg
<i>Strychnos ignatii</i> D 6	92,5 mg
<i>Iris versicolor</i> D 2	185,0 mg
<i>Lilium tigrinum</i> D 3	92,5 mg

Un ml picături orale soluție conține 32 de picături.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține alcool etilic (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Picături orale soluție

Un flacon a 50 ml

Un flacon a 100 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Medicament homeopat

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.  
A se utiliza în maxim 6 luni după prima deschidere a flaconului.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Bionorica SE  
Kerschensteinerstraße 11-15, D-92318, Neumarkt, Germania

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

2154/2009/01 – ambalajul cu un flacon a 50 ml  
2154/2009/02 – ambalajul cu un flacon a 100 ml

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Indicat la femei aflate la vârsta fertilă ca tratament în:

- tulburări de ciclu menstrual;
- sindrom premenstrual;
- mastopatie.

Mod de administrare: 30 de picături de două ori pe zi, dimineața și seara, cu puțină apă sau cu alt lichid.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Mastodynnon

**MASTODYNON picături orale soluție****INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR****FLACON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Mastodynon picături orale soluție

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un ml picături orale soluție conține:

<i>Vitex agnus castus</i> D1	185,0 mg;
<i>Caulophyllum thalictroides</i> D 4	92,5 mg;
<i>Cyclamen purpurascens</i> D 4	92,5 mg;
<i>Strychnos ignatii</i> D 6	92,5 mg;
<i>Iris versicolor</i> D 2	185,0 mg;
<i>Lilium tigrinum</i> D 3	92,5 mg.

Un ml picături orale soluție conține 32 de picături.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține alcool etilic.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Picături orale soluție

50 ml

100 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNACOPILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Medicament homeopat

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.  
A se utiliza în maxim 6 luni după prima deschidere a flaconului.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Bionorica SE  
Germania

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

2154/2009/01 – ambalajul cu un flacon a 50 ml  
2154/2009/02 – ambalajul cu un flacon a 100 ml

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Indicat la femei aflate la vârsta fertilă ca tratament în tulburări de ciclu menstrual, sindrom premenstrual și mastopatie.

Mod de administrare: conform prospectului.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**