

**Prospect: Informații pentru utilizator****Cebangin lămâie 5 mg/1 mg comprimate de supt**  
Diclorhidrat de clorhexidină/ Clorhidrat de lidocaină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 până la 4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Cebangin lămâie 5 g/1 mg și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cebangin lămâie 5 g/1 mg
3. Cum să utilizați Cebangin lămâie 5 g/1 mg
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cebangin lămâie 5 g/1 mg
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Cebangin lămâie 5 g/1 mg și pentru ce se utilizează**

Cebangin lămâie 5 mg/1 mg este un comprimat de supt cu acțiune locală la nivelul cavității bucale și a faringelui.

Este un antiseptic și un analgezic local.

Cebangin lămâie 5 mg/1 mg este indicat pentru:

- Tratamentul durerilor de gât, inflamației gâtului, tulburărilor faringiene și ale cavității bucale, însoțite de iritație, cum sunt inflamația gingială, mucoasei bucale și aftele.
- În cazul unei infecții bacteriene însoțite de febră, este necesar tratament suplimentar.

Cebangin lămâie 5 mg/1 mg nu conține zahăr, prin urmare, poate fi utilizat de către pacienții diabetici.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cebangin lămâie 5 g/1 mg****Nu utilizați Cebangin lămâie 5 g/1 mg:**

- dacă sunteți alergic la diclorhidrat de clorhexidină sau clorhidrat de lidocaină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).
- la copii cu vîrstă sub 6 ani.

## **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Cebangin lămâie, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

Cebangin lămâie 5 mg/1 mg nu trebuie administrat pe termen lung, fără întrerupere sau în mod repetat. Limitați utilizarea acestui medicament pentru ameliorarea durerii și iritației.

- Utilizarea unei doze prea mari (mai mult de 20 de comprimate pe zi) poate duce la un risc redus de diminuare a controlului reflexului de înghițire.
- Dacă luați alte medicamente. Vă rugăm să citiți și punctul „Cebangin lămâie 5 mg/1 mg împreună cu alte medicamente”.

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă oricare dintre cele de mai sus vi se aplică dumneavoastră sau vi s-au aplicat în trecut.

## **Copii**

Nu administrați acest medicament la copii cu vîrstă sub 6 ani.

## **Cebangin lămâie 5 g/1 mg împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ati utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

- Nu utilizați simultan alți dezinfecțanți.

## **Cebangin lămâie 5 g/1 mg împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

## **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptăți, credeți că ati putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Dacă sunt respectate precauțiile de mai sus, Cebangin lămâie 5 mg/1 mg poate fi utilizat în timpul sarcinii și alăptării. Informați-l pe medicul dumneavoastră dacă utilizați acest medicament.

## **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Administrarea Cebangin lămâie 5 mg/1 mg nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

**Cebangin lămâie 5 mg/1 mg conține sorbitol.** Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Sorbitolul poate avea un efect laxativ ușor. Valoarea calorică este de 2,6 kcal/g sorbitol.

**De asemenea, Cebangin lămâie 5 mg/1 mg conține aspartam.** Aceasta conține o sursă de fenilalanină și poate fi dăunător pentru persoanele cu fenilcetonurie (tulburare metabolică caracterizată prin valori crescute ale fenilalaninei în sânge).

## **3. Cum să utilizați Cebangin lămâie 5 g/1 mg**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală.

### **Adulți**

Doza recomandată este de o pastilă administrată de 6 ori pe zi; intervalul dintre administrări trebuie să fie de minim 4 ore.

### ***Copii cu vîrstă cuprinsă între 6 și 15 ani***

Doza recomandată este de o pastilă administrată de 2-3 ori pe zi; intervalul dintre administrări trebuie să fie de minim 4 ore.

#### *Copii cu vârstă sub 6 ani*

Nu trebuie administrat la copiii cu vârstă sub 6 ani.

Dacă nu apare nicio ameliorare în decurs de 3 - 4 zile de tratament, se recomandă să se adreseze unui medic.

Lăsați comprimatul să vi se topească lent în gură.

#### **Dacă utilizați mai mult Cebangin lămâie 5 g/1 mg decât trebuie**

Acest medicament conține numai o parte din doza toxică. Dacă este utilizat în mod corespunzător, riscurile de supradozaj sunt foarte mici.

Simptomele supradozajului sunt: neliniște, tinnitus, dificultate a respirației, tulburare a ritmului cardiac, control redus al reflexului de înghițire.

#### **Dacă uitați să utilizați Cebangin lămâie 5 g/1 mg**

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

#### **Dacă încetați să utilizați Cebangin lămâie 5 g/1 mg**

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Ca toate medicamentele, Cebangin lămâie 5 mg/1 mg poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

- Foarte rare: reacții alergice ale pielii și mucoaselor.

- În mod excepțional, pot apărea tulburări ale gustului, o senzație de iritare pe limbă și reacții alergice severe (reacții anafilactice).

- În cazul administrării prelungite și neîntrerupte, poate apărea colorarea dinților în maro. Totuși, culoarea maronie este ușor de îndepărtat.

#### Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Cebangin lămâie 5 g/1 mg**

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie/blister după „EXP”. Primele două cifre indică luna, următoarele două sau patru indică anul. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Cebangin lămâie 5 g/1 mg**

- Substanțele active sunt clorhidratul de clorhexidină 5 mg, clorhidratul de lidocaină 1 mg.
- Celelalte componente sunt sorbitol (E420), stearat de magneziu, aspartam (E 951), aromă de lămâie 501050 AP0551, acesulfam K.

### **Cum arată Cebangin lămâie 5 g/1 mg și conținutul ambalajului**

Se prezintă sub formă de comprimate de culoare albă până la aproape albă, rotunde, cu aromă de lămâie, cu diametrul de 15,8 - 16,2 mm.

Cebangin lămâie 5 mg/1 mg este disponibil în cutie cu 12, 24 sau 36 comprimate de supt, într-un blister perforat pentru eliberarea unei unități dozate.

Este posibil ca nu toate mărimele de ambalaj să fie comercializate.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

CEBIS International SRL  
Calea Plevnei, nr. 222, sector 6, 060016, București,  
România

### **Farbicantul:**

LABORATORIA QUALIPHAR N.V./S.A.  
Rijksweg 9, 2880 Bornem,  
Belgia

**Acest prospect a fost revizuit în mai 2019.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>