

Prospect: Informații pentru utilizator**Cebangin mentol 5 mg/1 mg comprimate de supt**
Diclorhidrat de clorhexidină/ Clorhidrat de lidocaină**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 până la 4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Cebangin mentol 5 g/1 mg și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cebangin mentol 5 g/1 mg
3. Cum să utilizați Cebangin mentol 5 g/1 mg
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cebangin mentol 5 g/1 mg
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cebangin mentol 5 g/1 mg și pentru ce se utilizează

Cebangin mentol 5 mg/1 mg este un comprimat de supt cu acțiune locală la nivelul cavității bucale și a faringelui.

Este un antiseptic și un analgezic local.

Cebangin mentol 5 mg/1 mg este indicat pentru:

- Tratatamentul durerilor de gât, inflamației gâtului, tulburărilor faringiene și ale cavității bucale, însoțite de iritație, cum sunt inflamația gingiilor, mucoasei bucale și aftele.
- În cazul unei infecții bacteriene însoțite de febră, este necesar tratament suplimentar.

Cebangin mentol 5 mg/1 mg nu conține zahăr, prin urmare, poate fi utilizat de către pacienții diabetici.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cebangin mentol 5 g/1 mg**Nu utilizați Cebangin mentol 5 g/1 mg:**

- dacă sunteți alergic la diclorhidrat de clorhexidină sau clorhidrat de lidocaină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).
- la copii cu vârsta sub 6 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Cebangin mentol, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

Cebangin mentol 5 mg/1 mg nu trebuie administrat pe termen lung, fără întrerupere sau în mod repetat. Limitați utilizarea acestui medicament pentru ameliorarea durerii și iritației.

- Utilizarea unei doze prea mari (mai mult de 20 de comprimate pe zi) poate duce la un risc redus de diminuare a controlului reflexului de înghițire.
- Dacă luați alte medicamente. Vă rugăm să citiți și punctul „Cebangin mentol 5 mg/1 mg împreună cu alte medicamente”.

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă oricare dintre cele de mai sus vi se aplică dumneavoastră sau vi s-au aplicat în trecut.

Copii

Nu administrați acest medicament la copii cu vârsta sub 6 ani.

Cebangin mentol 5 g/1 mg împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

- Nu utilizați simultan alți dezinfectanți.

Cebangin mentol 5 g/1 mg împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Dacă sunt respectate precauțiile de mai sus, Cebangin mentol 5 mg/1 mg poate fi utilizat în timpul sarcinii și alăptării. Informați-l pe medicul dumneavoastră dacă utilizați acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Administrarea Cebangin mentol 5 mg/1 mg nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Cebangin mentol 5 mg/1 mg conține sorbitol. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Sorbitolul poate avea un efect laxativ ușor. Valoarea calorică este de 2,6 kcal/g sorbitol.

3. Cum să utilizați Cebangin mentol 5 mg/1 mg

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală.

Adulți

Doza recomandată este de o pastilă administrată de 6 ori pe zi; intervalul dintre administrări trebuie să fie de minim 4 ore.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani

Doza recomandată este de o pastilă administrată de 2-3 ori pe zi; intervalul dintre administrări trebuie să fie de minim 4 ore.

Copii cu vârsta sub 6 ani

Nu trebuie administrat la copiii cu vârsta sub 6 ani.

Dacă nu apare nicio ameliorare în decurs de 3 - 4 zile de tratament, se recomandă să se adreseze unui medic.

Lăsați comprimatul să vi se topească lent în gură.

Dacă utilizați mai mult Cebangin mentol 5 mg/1 mg decât trebuie

Acest medicament conține numai o parte din doza toxică. Dacă este utilizat în mod corespunzător, riscurile de supradozaj sunt foarte mici.

Simptomele supradozajului sunt: neliniște, tinitus, dificultate a respirației, tulburare a ritmului cardiac, control redus al reflexului de înghițire.

Dacă uitați să utilizați Cebangin mentol 5mg/1 mg

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Dacă încetați să utilizați Cebangin mentol 5 mg/1 mg

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Ca toate medicamentele, Cebangin mentol 5 mg/1 mg poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

- Foarte rare: reacții alergice ale pielii și mucoaselor.

- În mod excepțional, pot apărea tulburări ale gustului, o senzație de iritare pe limbă și reacții alergice severe (reacții anafilactice).

- În cazul administrării prelungite și neîntrerupte, poate apărea colorarea dinților în maro. Totuși, culoarea maronie este ușor de îndepărtat.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cebangin mentol 5 mg/1 mg

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie/blister după „EXP”. Primele două cifre indică luna, următoarele două sau patru indică anul. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Cebangin mentol 5 mg/1 mg

- Substanțele active sunt diclorhidratul de clorhexidină 5 mg, clorhidratul de lidocaină 1 mg.
- Celelalte componente sunt sorbitol (E420), stearat de magneziu, acid citric anhidru, levomentol.

Cum arată Cebangin mentă 5 mg/1 mg și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de comprimate de supt de culoare albă ușor pătate, rotunde, ușor pătate, cu aromă de mentă, cu diametrul de 15,8 - 16,2 mm, grosime: 4,9 – 5,3 mm.

Cebangin mentol 5 mg/1 mg este disponibil în cutie cu 12, 24 sau 36 comprimate de supt, într-un blister perforat pentru eliberarea unei unități dozate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

CEBIS International SRL

Calea Plevnei, nr. 222, sector 6, 060016, București, România

Farbicantul:

LABORATORIA QUALIPHAR N.V./S.A.

Rijksweg 9 - 2880 Bornem – Belgia

Acest prospect a fost revizuit în mai 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>