

Prospect: Informații pentru utilizator**Neo-angin fără zahăr cireșe pastile**
alcool 2,4 diclorobenzilic/amilmetacrezol/levomentol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nenumționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3-4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Neo-angin fără zahăr cireșe pastile și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Neo-angin fără zahăr cireșe pastile
3. Cum să utilizați Neo-angin fără zahăr cireșe pastile
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Neo-angin fără zahăr cireșe pastile
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Neo-angin fără zahăr cireșe pastile și pentru ce se utilizează

Neo-angin fără zahăr cireșe este un medicament antiseptic utilizat pentru cavitatea bucală și gât. Adulții și copiii cu vârsta de și peste șase ani pot utiliza acest medicament ca tratament adjuvant în infecții ale cavității bucale și gâtului, însoțite de simptome tipice ca durerea, înroșirea sau umflarea gâtului.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Neo-angin fără zahăr cireșe pastile**Nu utilizați Neo-angin fără zahăr cireșe pastile:**

- dacă sunteți alergic la alcool 2,4 diclorobenzilic, amilmetacrezol, levomentol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- la copii cu vârsta sub 6 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Neo-angin fără zahăr cireșe pastile, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Copii

Neo-angin fără zahăr cireșe nu se administrează copiilor cu vârsta sub 6 ani. Pentru a putea utiliza acest medicament copiii trebuie să poată controla dizolvarea ușoară a pastilei în gură.

Trebuie să vă adresați unui medic dacă după 3-4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău.

Neo-angin fără zahăr cireșe zahăr pastile împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Neo-angin fără zahăr cireșe pastile împreună cu alimente, băuturi și alcool

Neo-angin fără zahăr cireșe pastile se administrează independent de orele de masă.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Sarcina

Datele provenite din utilizarea substanțelor active din compoziția Neo-angin fără zahăr cireșe la femeile gravide sunt inexistente sau limitate.

Studiile la animale nu au evidențiat efecte toxice daunătoare directe sau indirecte asupra funcției de reproducere.

Din cauza informațiilor insuficiente, nu este posibilă eliminarea totală a riscurilor asupra fătului, prin urmare, nu se recomandă utilizarea medicamentului în timpul sarcinii.

Alăptarea

Există informații insuficiente cu privire la excreția substanțelor active/metaboliților acestora în laptele uman. Prin urmare, Neo-angin fără zahăr cireșe nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Fertilitatea

Nu au fost efectuate studii pentru evaluarea efectelor acestui medicament asupra fertilității.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Neo-angin fără zahăr cireșe pastile nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Neo-angin fără zahăr cireșe conține Ponceau 4R (E124), alcool benzilic, antioxidant BHA (E320) și izomalț (E953).

Neo-angin fără zahăr cireșe conține colorantul Ponceau 4R (E124) care poate provoca reacții alergice. Cantitatea de alcool benzilic per pastilă este de 0,30 mg, care poate provoca reacții alergice.

Acest medicament conține 0,30 mg alcool benzilic (component al aromei de cireșe) în cantitate foarte mică per pastilă (2,6 g). Alcoolul benzilic poate provoca reacții alergice.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă sunteți gravidă sau alăptați sau dacă aveți o boală de ficat sau rinichi, deoarece cantități mari de alcool benzilic acumulate la nivelul corpului dumneavoastră pot cauza reacții adverse (denumite “acidoză metabolică”).

Aroma de cireșe din acest medicament conține și antioxidant BHA (E320) care poate provoca iritații ale membranelor mucoase.

Neo-angin fără zahăr cireșe conține 2,58 g de izomalț (E953) ca și înlocuitor al zahărului, corespunzător la 6 kcal (26 kJuli). Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienților cu diabet zaharat.

Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că aveți o intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte să utilizați acest medicament.

Izomalțul poate avea un ușor efect laxativ.

3. Cum să utilizați Neo-angin fără zahăr cireșe pastile

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este:

Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani: dacă medicul nu vă recomandă altfel, lăsați o pastilă Neo-angin fără zahăr cireșe să se dizolve încet în gură la 2-3 ore. Doza maximă este de 6 pastile pe zi.

Dacă utilizați mai mult Neo-angin fără zahăr cireșe pastile decât trebuie

Nu s-au semnalat cazuri de supradozaj la om.

În cazul puțin probabil de supradozaj, reacțiile adverse descrise se pot intensifica. În acest caz, se recomandă tratament simptomatic.

Dacă uitați să utilizați Neo-angin fără zahăr cireșe pastile

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vă confrunțați cu una dintre următoarele reacții adverse, opriți imediat utilizarea Neo-angin fără zahăr cireșe și contactați-l imediat pe medicul dumneavoastră:

Foarte rare (afectează până la 1 din 10000 persoane): iritații ale mucoasei bucale și gastrice, cum sunt greutate în digestie, greață.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile): reacții alergice cum sunt umflarea gurii, a limbii și buzelor, mâncărimi.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la:

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Neo-angin fără zahăr cireșe pastile

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate. Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Neo-angin fără zahăr cireșe pastile

Substanțele active sunt: alcool 2,4 diclorobenzilic, amilmetacrezol și levomentol. Fiecare pastilă conține alcool 2,4 diclorobenzilic 1,20 mg, amilmetacrezol 0,60 mg și levomentol 5,90 mg.

Celelalte componente sunt: izomalt, acid tartric, aromă de cireșe, care conține printre altele alcool benzilic și antioxidant BHA (E 320), ulei de mentă, Ponceau 4R (E 124), indigotină (E 132).

Cum arată Neo-angin fără zahăr cireșe pastile și conținutul ambalajului

Neo-angin fără zahăr cireșe se prezintă sub formă de pastile rotunde, biconvexe, de culoare roșie, ușor transparente, cu gust dulce și aromă caracteristică de cireșe.

Este disponibil în cutii cu 1 blister din PVC/PVDC/Al, conținând 12 pastile, cutii cu 2 blistere din PVC/PVDC/Al a câte 8 pastile/blister, cutii cu 2 blistere din PVC/PVDC /Al a câte 12 pastile/blister, cutii cu 4 blistere din PVC/PVDC/Al a câte 12 pastile/blister.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Divapharma GmbH

Motzener Str. 41, 12277 Berlin, Germania

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>