

Prospect: Informații pentru utilizator**TRAMAL RETARD 150 mg comprimate cu eliberare prelungita**
Clorhidrat de tramadol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să să fie nevoie să-l recitați.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tramal Retard 150 mg și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tramal Retard 150 mg
3. Cum să utilizați Tramal Retard 150 mg
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tramal Retard 150 mg
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

1. Ce este Tramal Retard 150 mg și pentru ce se utilizează

Tramadolul – substanță activă din Tramal Retard 150 mg - este un analgezic ce aparține clasei opioidelor a cărui acțiune se desfășoară la nivelul sistemului nervos central. El combată durerea acționând la nivelul celulelor nervoase specifice din măduva spinării și creier.

Tramal Retard 150 mg se utilizează pentru tratamentul durerii moderate - severe.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tramal Retard 150 mg**Nu utilizați Tramal Retard 150 mg:**

- dacă sunteți alergic la tramadol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).
- în intoxicația acută cu alcool, somnifere, alte analgezice sau medicație psihotropă (medicamente care influențează dispoziția și emoțiile).
- dacă utilizați și inhibitori MAO (medicamente utilizate în tratamentul depresiei) sau le-ați utilizat în ultimele 14 zile înaintea tratamentului cu Tramal Retard 150 mg (vezi *Tramal Retard împreună cu alte medicamente*).
- dacă sunteți epileptic și crizele epileptice nu sunt în mod adecvat controlate prin tratament.
- ca substitut în sindromul de întrerupere la droguri.

Atenționări și precauții :

Înainte să luați Tramal Retard 150 mg adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

- dacă credeți că sunteți dependent de alte medicamente analgezice (opioide);
- dacă suferiți de tulburări ale conștiinței (dacă simțiți că veți leșina);
- dacă sunteți în stare de șoc (transpirațiile reci pot fi un semn pentru aceasta);

- dacă suferiți de presiune intracraniană crescută (posibil după un traumatism cranian sau boală cerebrală);
- dacă prezentați dificultăți la respirație;
- dacă aveți predispoziție spre epilepsie sau convulsii, deoarece riscul la convulsii poate fi crescut;
- dacă suferiți de o boală renală sau hepatică.

Crizele epileptice au fost raportate la pacienții care au utilizat tramadol în dozele recomandate. Riscul poate fi crescut când dozele de tramadol depășesc doza maximă zilnică (400mg).

Vă rugăm să aveți în vedere că Tramal Retard 150 mg poate determina dependență fizică și psihică. Atunci când Tramal Retard 150 mg este utilizat timp îndelungat, efectul său poate să scadă, astfel încât trebuie utilizate doze mai mari (dezvoltarea toleranței).

La pacienții cu tendință spre abuz de medicamente sau care sunt dependenți de medicamente, tratamentul cu Tramal Retard 150 mg trebuie administrat numai pe perioade scurte de timp și sub supraveghere medicală atentă.

Vă rugăm, de asemenea, să informați medicul dacă una dintre aceste probleme apare în timpul tratamentului cu Tramal Retard 150 mg sau a apărut în trecut.

Tramal Retard 150 mg împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alt medicament.

Tramal Retard 150 mg nu trebuie administrat concomitent cu inhibitori MAO (sau alte medicamente pentru tratamentul depresiei).

Efectul analgezic al Tramal Retard 150 mg poate fi redus și timpul de acțiune poate fi scurtat dacă luați medicamente care conțin:

- carbamazepină (pentru crizele convulsive epileptice);
- ondansetron (pentru prevenirea greșurilor).

Medicul dumneavoastră vă va informa dacă trebuie administrat Tramal Retard 150 mg și în ce doză.

Riscul efectelor secundare crește:

- dacă utilizați tranchilizante, somnifere, alte analgezice precum morfina și codeina (chiar și ca medicament pentru tuse) și alcool în timp ce luați Tramal Retard 150 mg. Vă puteți simți somnoros sau slăbit. Dacă percepți aceste simptome, vă rugăm anunțați medicul.
- dacă utilizați medicamente care pot declansa convulsii, cum sunt unele antidepresive sau antipsihotice. Riscul de a se produce o criză convulsivă poate crește dacă utilizați Tramal Retard 150 mg în același timp. Medicul dumneavoastră vă va spune dacă Tramal Reetard 150 mg este potrivit pentru dumneavoastră.
- dacă utilizați unele antidepresive.

Tramal Retard 150 mg poate interacționa cu aceste medicamente și puteți simți contracții ritmice involuntare ale mușchilor, inclusiv a mușchilor ce controlează mișcările ochilor, agitație, transpirație excesivă, tremurături, exagerarea reflexelor, tensiune musculară crescută, temperatură corpului peste 38°C .

- dacă utilizați anticoagulante cumarinice (medicație anticoagulantă), de exemplu warfarina împreună cu Tramal Retard 150 mg. Efectul acestor medicamente în coagularea sângei poate fi afectat și pot apărea sângerări.

TRAMAL RETARD 150 mg cu alimente, băuturi și alcool

Nu consumați alcool în timpul tratamentului cu Tramal Retard 150 mg, deoarece efectele alcoolului pot fi potențiate. Alimentația nu influențează efectul Tramal Retard 150 mg.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Există foarte puține informații cu privire la siguranța tramadolului în perioada sarcinii. Prin urmare nu ar trebui să utilizați Tramal Retard 150 mg dacă sunteți însărcinată.

Utilizarea cronică în timpul sarcinii poate determina sindrom de întrerupere la nou născut.

În general, utilizarea tramadol nu este recomandată în timpul alăptării. Cantități mici de tramadol pot fi excretate în laptele matern. După administrarea unei singure doze, de obicei nu este necesară întreruperea alăptatului.

Pe baza experienței de utilizare a tramadolului la om, se sugerează că acesta nu influențează fertilitatea la femei și bărbați.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Tramal Retard 150 mg poate produce somnolență, amețeală și vedere înceșoară și în consecință vă poate influența reactivitatea. Dacă simțiți că reactivitatea dumneavoastră este afectată, nu conduceți mașina sau alte vehicule, nu utilizați unelte electrice și nu folosiți utilaje.

Tramal Retard 150 mg conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele zaharuri, contactați medicul înainte de a lua acest medicament. Aceasta deoarece aceste tablete conțin lactoză.

3. Cum să utilizați Tramal Retard 150 mg

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul . Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistului dacă nu sunteți sigur.

Doza trebuie adaptată la intensitatea durerii și la sensibilitatea individuală la durere. În general, trebuie utilizate cele mai mici doze care combat durerea. Nu luați mai mult de 400 mg clorhidrat de tramadol pe zi, decât dacă medicul dumneavoastră vă recomandă altfel.

Cu excepția cazurilor în care medicul a prescris altfel, dozele uzuale sunt:

Adulți și adolescenți cu vîrstă peste 12 ani:

Un comprimat de Tramal Retard 150 mg de două ori pe zi (echivalentul a 300mg clorhidrat de tramadol pe zi), preferabil dimineața și seara.

Medicul dumneavoastră vă poate prescrie Tramal Retard cu o concentrație diferită, mai potrivită pentru dumneavoastră, dacă este necesar.

Dacă este necesar, doza poate fi crescută la 150 - 200 mg clorhidrat de tramadol de 2 ori pe zi (corespunzător la 300 - 400 mg clorhidrat de tramadol zilnic)

Copii

Tramal Retard 150 mg nu este indicat pentru copiii cu vîrstă mai mică de 12 ani.

Pacienți în vîrstă

La pacienții în vîrstă (peste 75 ani) excreția tramadolului poate fi întârziată. Dacă aceasta este valabilă pentru dumneavoastră, medicul vă poate recomanda prelungirea intervalului dintre doze.

Afecțiune hepatică sau renală severă (insuficiență)/ pacienți dializați

Dacă suferiți de insuficiență hepatică și/sau renală severă, nu trebuie să utilizați Tramal Retard 150 mg. Dacă în cazul dumneavoastră insuficiența este ușoară sau moderată, medicul dumneavoastră vă poate recomanda prelungirea intervalului dintre doze.

Cum și când trebuie să utilizați Tramal Retard 150 mg?

Comprimatele cu eliberare prelungită Tramal Retard 150 mg sunt pentru administrare orală.

Întotdeauna înghițiți comprimatele cu eliberare prelungită Tramal Retard 150 mg întregi, nu le divizați sau mestecați, cu o cantitate suficientă de lichid, preferabil dimineața și seara.

Puteți lua comprimatele pe stomacul gol sau în timpul mesei.

Cât timp trebuie să utilizați Tramal Retard 150 mg?

Nu trebuie să luați Tramal Retard 150 mg mai mult timp decât este necesar.

Dacă necesitați tratament de lungă durată, medicul dumneavoastră trebuie să verifice la intervale de timp scurte și regulate (dacă este necesar cu întineruperi de tratament) dacă va trebui continuat tratamentul cu Tramal Retard 150 mg și în ce doză.

Informați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă simțiți că efectul Tramal Retard 150 mg este prea puternic sau prea slab.

Dacă luați mai mult Tramal Retard 150 mg decât trebuie

Dacă ați luat din greșeală o doză în plus de Tramal Retard 150 mg, aceasta nu va avea în general efecte negative.

Va trebui să luați doza următoare conform prescripției medicale.

După utilizarea unor doze foarte mari, pot să apară pupile punctiforme, vărsături, scădere tensiunii arteriale, bătăi rapide ale inimii, colaps, reducerea stării de conștientă până la comă (stare de inconștiență profundă), convulsiile epileptice și dificultăți respiratorii, până la oprirea respirației. În asemenea cazuri sunați cel mai apropiat medic!

Dacă uitați să luați Tramal Retard 150 mg

Dacă ați uitat să luați comprimatele, durerea s-ar putea să reapară. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată, ci continuați să luați comprimatele ca și înainte.

Dacă încetați să luați Tramal Retard 150 mg

În cazul în care întinerupeți sau terminați prea repede tratamentul cu Tramal Retard 150 mg, este posibil ca durerea să reapară. Dacă doriți să întinerupeți tratamentul datorită efectelor neplăcute, adresați-vă medicului dumneavoastră.

În general, nu vor fi efecte nedorite după întineruperea tratamentului cu Tramal Retard 150 mg.

Totuși, în cazuri rare, unei pacienți care au utilizat Tramal Retard 150 mg pentru o perioadă mai lungă de timp, pot să se simtă rău la întineruperea bruscă a tratamentului. Ei pot prezenta o stare de agitație, anxietate, nervozitate sau tremor. Ei pot fi hiperactivi, pot să aibă insomnie, și pot resimți tulburări gastrice sau intestinale. Foarte puțini oameni pot avea atacuri de panică, halucinații, percepții denaturate cum ar fi mâncărini, pișcături, furnicături și ţiuț în urechi (tinnitus). Alte simptome SNC (sistem nervos central) neobișnuite, și anume confuzie, iluzii, schimbare a percepției despre propria personalitate (depersonalizare), schimbare în percepția realității (derealizarea) și iluzie a persecuției (paranoia) au fost observate foarte rar. Dacă vreuna dintre aceste simptome apare după întineruperea tratamentului cu Tramal Retard 150 mg, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Trebuie să consultați imediat un medic dacă aveți simptome ale unei reacții alergice, cum ar fi umflarea feței, limbii și / sau gâtului, și / sau dificultate la înghițire sau urticarie împreună cu dificultăți în respirație.

Cele mai frecvente reacții adverse în timpul tratamentului cu Tramal Retard 150 mg sunt greața și amețelile, care pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane.

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane

- amețeală
- greață

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane

- dureri de cap, somnolență
- oboseală
- constipație, uscăciunea gurii, vârsături
- transpirații (hiperhidroză)

Mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane

- efecte asupra cordului și circulației sangvine (batăi puternice ale inimii, tahicardie, senzație de leșin sau colaps). Aceste efecte adverse pot apărea în special când pacienții sunt în picioare sau în caz de efort fizic.
- senzație iminentă de vârsătură (râgâială), tulburări gastrice (cum ar fi balonare, presiune resimțită la nivelul stomacului), diaree
- reacții cutanate (cum ar fi mâncărime, erupții cutanate)

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane

- reacții alergice (cum ar fi dificultăți în respirație, respirație řuerătoare, edeme ale pielii) și soc (insuficiență circulatorie bruscă) au fost raportate în cazuri foarte rare.
- bătăi lente ale inimii
- creșterea presiunii sângelui
- senzații anormale (cum ar fi mâncărimi, furnicături, senzația de amortire), tremor, crize de epilepsie, contracții musculare, mișcări necordonate, pierderi tranzitorii ale conștiinței (sincopa), tulburări de vorbire.
- crizele de epilepsie au apărut după doze mari de tramadol sau când tramadol a fost administrat în același timp cu alte medicamente care pot determina convulsii
- modificări ale apetitului
- halucinație, stare de confuzie, tulburări de somn, delir, anxietate și coșmaruri.
- după tratamentul cu Tramal Retard 100 mg pot să apară tulburări psihice. Intensitatea și natura lor pot varia (în funcție de personalitatea pacientului și durata tratamentului). Acestea pot să apară sub formă de modificări ale dispoziției (în general veselie, ocazional stare de iritație), modificări ale activității (în general reducere, ocazional intensificare) și scăderea percepției cognitive și a percepției senzoriale (modificări ale lucidității și recunoașterii, care pot determina greșeli de judecată)
- poate să apară dependență de medicament.
- vedere încețoșată, conștricția pupilei (mioză), dilatarea excesivă a pupilei (midriază)
- respirație incetinită, scurtarea respirației (dispnee)

- au fost raportate cazuri de agravare a astmului bronșic, totuși nu a fost demonstrat ca acestea au fost determinate de tramadol. Dacă dozele recomandate sunt depășite sau dacă, în același timp, se utilizează alte medicamente care deprimă funcția cerebrală, poate apărea deprimare respiratorie.
- slabiciune musculară
- dificultăți în urinare sau durere, scăderea cantității de urină (disurie).

Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane

- valoare crescute ale enzimelor hepatice

Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

- scăderea nivelului de zahăr în sânge

Dacă Tramal Retard 150 mg a fost utilizat timp îndelungat, poate să apară dependența de medicament, acest risc este totuși foarte mic.

Când tratamentul se întrerupe brusc, pot apărea semne ale sindromului de întrerupere a medicamentului (vezi *Dacă încetați să luați Tramal Retard 150 mg*).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tramal Retard 150 mg

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protecția mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tramal Retard 150 mg

Substanța activă este clorhidratul de tramadol.

Tramal Retard 150 mg, comprimate cu eliberare prelungita

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conține 150 mg clorhidrat de tramadol.

Celealte componente sunt:

Nucleu: hipromeloză 100 000 mPa.S, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, celuloză microcristalină.

Film: hipromeloză 6 mPa.S, lactoză monohidrat (vezi pct. 2 "Tramal Retard 150 mg conține lactoză", macrogol 6000, propilenglicol, talc, dioxid de titan (E 171), galben de chinolină - sare de aluminiu (E 104), oxid roșu de fier (E 172).

Cum arată Tramal Retard 150 mg și conținutul ambalajului

Comprimatele cu eliberare prelungită Tramal Retard 150 mg sunt rotunde, biconvexe, slab colorate în portocaliu inscripționate cu logo-ul producătorului  pe una dintre fețe și cu T2 iar pe cealaltă față Cutie cu 1 blister din PVC-PVdC/Al cu 10 comprimate cu eliberare prelungită.
Cutie cu 1 blister din PP/Al cu 10 comprimate cu eliberare prelungită.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

STADA ARZNEIMITTEL AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania

Fabricantul

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanții locali ai deținătorului autorizației de punere pe piață.

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie, 2023.