

**Prospect: Informații pentru utilizator****Ciprocin 250 mg comprimate filmate**  
Ciprofloxacină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Ciprocin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ciprocin
3. Cum să utilizați Ciprocin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Ciprocin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Ciprocin și pentru ce se utilizează**

Ciprocin este un antibiotic care aparține familiei chinolonelor. Substanța activă este ciprofloxacina. Ciprofloxacina acționează prin distrugerea bacteriilor care produc infecții. Acest medicament acționează numai asupra anumitor tulpini (specii) de bacterii.

Adulți

Ciprocin se utilizează la adulți pentru tratamentul următoarelor infecții bacteriene:

- infecții ale tractului respirator
- infecții prelungite sau recidivante (repetate) ale urechilor sau sinusurilor
- infecții ale tractului urinar
- infecții la nivelul testiculelor
- infecții ale organelor genitale la femei
- infecții ale tractului gastro-intestinal și infecții intra-abdominale
- infecții ale pielii și țesuturilor moi
- infecții ale oaselor și articulațiilor
- tratamentul infecțiilor la pacienții care au un număr foarte mic de celule albe sanguine (neutropenie)

- prevenirea infecțiilor la pacienții care au un număr foarte mic de celule albe sanguine (neutropenie)
- prevenirea infecțiilor produse de bacteria *Neisseria meningitidis*
- expunerea la antrax, prin inhalare.

Dacă aveți o infecție severă sau o infecție produsă de mai multe tipuri de bacterii, este posibil să primiți tratament antibiotic suplimentar, pe lângă Ciprocin.

### Copii și adolescenți

Ciprocin se utilizează la copii și adolescenți, sub supraveghere medicală de specialitate, pentru tratamentul următoarelor infecții bacteriene:

- infecții ale plămânilor și bronhiilor la copii și adolescenți cu fibroză chistică
- infecții complicate ale tractului urinar, incluzând infecții care au ajuns la nivelul rinichilor (pielonefrită)
- expunerea (suspectată sau confirmată) la antrax, prin inhalare.

De asemenea, Ciprocin poate fi utilizat pentru tratamentul altor infecții severe specifice, la copii și adolescenți, când medicul consideră că este necesar.

## **2.Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ciprocin**

### **Nu utilizați Ciprocin:**

- dacă sunteți alergic la substanța activă, la alte medicamente chinolone sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).
- luați tizanidină (vezi pct. 2: Utilizarea altor medicamente).

### **Atenționări și precauții**

Spuneți medicului sau farmacistului înainte să luați Ciprocin dacă:

- ați avut vreodată probleme cu rinichii, deoarece poate fi necesară ajustarea tratamentului dumneavoastră
- aveți epilepsie sau alte boli neurologice
- ați avut în antecedente probleme la nivelul tendoanelor, în urma unor tratamente anterioare cu antibiotice de tipul Ciprocin
- sunteți diabetic deoarece este posibil să aveți risc de hipoglicemie atunci când luați ciprofloxacina.
- aveți miastenie gravis (o boală musculară)
- aveți probleme cu inima. Ciprofloxacina trebuie luată cu precauție dacă aveți din naștere sau aveți istoric familial de prelungire a intervalului QT (văzut pe EKG), aveți un dezechilibru al sărurilor din sânge, în special concentrații scăzute ale potasiului și magneziului din sânge; dacă ritmul bătăilor inimii dumneavoastră este scăzut (bradicardie), dacă aveți inima slabă (insuficiență cardiacă), aveți istoric de atac de cord (infarct miocardic), sunteți femeie sau vârstnic sau luați medicamente ce sunt cunoscute că pot afecta ritmul normal al bătăilor inimii (vezi secțiunea Ciprocin împreună cu alte medicamente)
- dacă știți că dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră aveți deficit de glucoză-6-fosfat dehidrogenază (G6PD), deoarece puteți avea risc de anemie în cazul administrării ciprofloxacinei
- - dacă ați fost diagnosticat cu o lărgire sau “umflare” a unui vas mare de sânge (anevrism aortic sau anevrism al unui vas periferic mare).
- - dacă ați avut un episod anterior de disecție de aortă (o ruptură în peretele aortei).

- - dacă aveți antecedente familiale de anevrism aortic sau de disecție de aortă sau alți factori de risc sau afecțiuni predispozante (de exemplu, tulburări ale țesutului conjunctiv, cum ar fi sindromul Marfan sau sindromul Ehlers-Danlos – forma vasculară, sau tulburări vasculare, cum ar fi arterita Takayasu, arterita cu celule gigante, boala Behcet, tensiune arterială mare sau ateroscleroză cunoscută).

Pentru tratamentul anumitor infecții ale tractului genital, medicul dumneavoastră vă poate prescrie și alt antibiotic pe lângă ciprofloxacina. Dacă nu vă simțiți mai bine după trei zile de tratament, vă rugăm să îl consultați pe medicul dumneavoastră.

### În timp ce luați Ciprocina

Spuneți imediat medicului dacă apar oricare din următoarele boli, **în timp ce luați Ciprocina**. Medicul va decide dacă tratamentul cu Ciprocina trebuie întrerupt.

- **Reacție alergică severă și bruscă** (reacție anafilactică/șoc anafilactic, edem angioneurotic); există un risc mic să aveți o reacție alergică severă chiar de la prima doză, manifestată prin următoarele simptome: senzație de apăsare în piept, amețeli, senzație de rău sau leșin sau amețeli când vă ridicați în picioare. **Dacă apar aceste simptome încetați să luați Ciprocina și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.**

Ocazional pot apărea **dureri și umflături la nivelul articulațiilor și tendinită**, în special dacă sunteți vârstnic și ați fost tratat și cu corticosteroizi. Inflamația și rupturile de tendoane pot surveni în primele 48 ore de tratament și chiar până la câteva luni de la oprirea tratamentului cu Ciprocina. La primul semn de durere sau inflamație a unui tendon (de exemplu la nivelul gleznei, articulației mâinii, cotului, umărului sau genunchiului), încetați să luați Ciprocina, contactați-l pe medicul dumneavoastră și țineți zona dureroasă în repaus. Evitați orice efort inutil, deoarece acesta poate crește riscul de ruptură de tendon.

- 
- Dacă aveți **epilepsie** sau alte **boli neurologice** cum sunt ischemie cerebrală sau accident vascular cerebral, este posibil să aveți reacții adverse legate de sistemul nervos central. În acest caz, întrerupeți tratamentul cu Ciprocina și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.
- Când luați Ciprocina pentru prima dată, puteți avea **reacții psihice**. Dacă suferiți de **depresie sau psihoză**, simptomele dumneavoastră se pot agrava în timpul tratamentului cu Ciprocina. În cazuri rare, depresia și psihoza pot evolua cu gânduri de suicid, tentative de suicid sau sinucidere. În acest caz, întrerupeți tratamentul cu Ciprocina și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.
- Puteți avea simptome de neuropatie, incluzând durere, arsură, furnicături, amorțeală și/sau slăbiciune musculară. În acest caz, întrerupeți tratamentul cu Ciprocina și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.
- Hipoglicemia s-a raportat cel mai des la pacienții cu diabet, în special la vârstnici. Dacă acest lucru vi se întâmplă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.
- Poate apărea **diaree** în timp ce luați antibiotice, inclusiv Ciprocina, chiar la câteva săptămâni după ce ați terminat tratamentul. Dacă diareea devine severă sau persistentă sau dacă observați prezența de sânge sau mucus în materiile fecale, încetați imediat să luați Ciprocina, deoarece vă poate pune viața în pericol. Nu luați medicamente care opresc sau încetinesc mișcările intestinale și adresați-vă medicului dumneavoastră.
- Dacă în timpul tratamentului cu ciprofloxacina vă este afectată vederea sau dacă aveți oricare alte tulburări la nivelul ochilor (inflamație, durere oculară ce se poate accentua la lumină sau la efortul de a citi, lăcrimare), adresați-vă imediat unui medic oftalmolog (vezi secțiunea 4, Reacții adverse posibile).

- În timp ce luați Ciprocin, pielea dumneavoastră devine mai **sensibilă la lumina soarelui sau la razele ultraviolete (UV)**. Evitați expunerea la lumina puternică a soarelui și la razele UV artificiale (de exemplu băi de soare).
- 
- Dacă trebuie să efectuați o **analiză de sânge sau de urină**, spuneți medicului sau personalului laboratorului de analize că urmați tratament cu Ciprocin.
- Dacă aveți probleme cu rinichii, anunțați-l pe medicul dumneavoastră, s-ar putea să vă modifice doza.
- Ciprocin poate **produce leziuni la nivelul ficatului**. Dacă observați orice simptome cum sunt pierderea apetitului (poftei de mâncare), icter (îngălbenirea pielii și a albului ochilor), urină închisă la culoare, mâncărime sau sensibilitate la nivelul stomacului, încetați să luați Ciprocin și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.
- Ciprocin poate diminua numărul de celule albe din sânge și **rezistența dumneavoastră la infecții poate fi scăzută**. Dacă aveți o infecție cu simptome cum sunt febră și deteriorarea gravă a stării generale, sau febră și simptome de infecție locală cum sunt dureri la nivelul gâtului/faringelui/gurii sau probleme urinare, trebuie să vă adresați imediat medicului. Vi se vor efectua analize de sânge pentru a verifica posibila scădere a celulelor albe în sânge (agranulocitoză). Este important să informați medicul dumneavoastră că luați acest medicament.
- Spuneți medicului dacă știți că dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră aveți deficit de glucoză-6-fosfat dehidrogenază (G6PD), deoarece puteți avea risc de anemie în cazul administrării ciprofloxacinei.
- Dacă simțiți brusc dureri severe în abdomen, în piept sau în spate, mergeți imediat la un serviciu de urgență.

### **Ciprocin împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

**Nu luați Ciprocin împreună cu tizanidină**, deoarece aceasta poate determina reacții adverse cum sunt scăderea presiunii sângelui și somnolență (vezi pct. 2: „Nu luați Ciprocin”).

Se cunoaște faptul că următoarele medicamente interacționează cu Ciprocin în corpul dumneavoastră. Utilizarea Ciprocin împreună cu aceste medicamente poate influența efectul terapeutic al medicamentelor respective. De asemenea, poate crește probabilitatea de apariție a reacțiilor adverse.

### **Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:**

- Antagoniști ai vitaminei K ( de ex. Warfarină, acenocoumarol, fenprocoumon sau fluidionă) sau orice alte medicamente anticoagulante (pentru fluidificarea sângelui).
- probenecid (pentru gută)
- metotrexat (pentru anumite tipuri de cancer, psoriazis și poliartrită reumatoidă)
- teofilină (pentru probleme respiratorii)
- tizanidină (pentru spasticitate musculară în scleroza multiplă)
- olanzapină (un medicament antipsihotic)
- clozapină (un medicament antipsihotic)
- ropinirol (pentru boala Parkinson)
- fenitoină (pentru epilepsie)
- ciclosporină ( pentru boli ale pielii, artrită reumatoidă și transplant de organe)
- alte medicamente care pot altera frecvența bătăilor inimii: medicamente aparținând unui grup de medicamente denumite antiaritmice (de ex. chinidina, hidrochinidina, disopiramide),

amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida), antidepressive triciclice, anumite antimicrobiene (care aparțin unui grup de medicamente denumite macrolide), anumite antipsihotice.

- Glibenclamidă (pentru tratarea diabetului)

Ciprocin poate **crește** concentrațiile următoarelor medicamente în sânge:

- Pentoxifilină (pentru tulburări circulatorii)
- Cafeină.
- Duloxetină (pentru depresie, leziuni ale nervilor în diabet sau incontinență)
- Lidocaină (pentru tratamentul anumitor boli de inimă sau anestezie)
- Sildenafil (pentru tratamentul disfuncțiilor erectile)
- Agomelatină (pentru tratamentul depresiei)
- Zolpidem (pentru tratamentul insomniei sau anumitor boli ale creierului)

Unele medicamente **reduc** efectul Ciprocin. Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați sau doriți să luați:

- antiacide
- omeprazol
- suplimente minerale
- sucralfat
- un chelator polimeric al fosfatului (de exemplu sevelamer)
- medicamente sau suplimente care conțin calciu, magneziu, aluminiu sau fier.

Dacă este esențial să luați aceste medicamente, luați Ciprocin la un interval de două ore înainte și patru ore după ce ați luat aceste medicamente.

### **Ciprocin împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Cu excepția cazului în care luați Ciprocin în timpul meselor, nu mâncați sau nu beți produse lactate (cum sunt lapte sau iaurt) sau băuturi cu supliment de calciu când luați comprimatele, deoarece acestea pot afecta absorbția substanței active.

Amintiți-vă să beți multe lichide în timp ce luați Ciprocin.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Este preferabil să evitați să utilizați Ciprocin în timpul sarcinii. Spuneți medicului dumneavoastră dacă intenționați să rămâneți gravidă.

Nu luați Ciprocin în timpul alăptării, deoarece ciprofloxacina se excretă în laptele matern și poate fi dăunătoare pentru copilul dumneavoastră.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Ciprocin vă poate face mai puțin alert. Pot să apară anumite reacții adverse neurologice. Trebuie să vă asigurați că știți cum reacționează organismul dumneavoastră la Ciprocin înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Dacă nu sunteți sigur, adresați-vă medicului dumneavoastră.

## **3. Cum să utilizați Ciprocin**

Medicul dumneavoastră vă va explica exact cât de mult Ciprocin trebuie să luați, cât de des și pentru cât timp. Aceasta va depinde de tipul infecției pe care o aveți și de cât de gravă este aceasta.

Spuneți medicului dacă aveți probleme cu rinichii, deoarece în acest caz s-ar putea să fie necesară ajustarea dozei dumneavoastră.

Tratamentul durează de obicei între 5 și 21 zile, dar poate dura mai mult în cazul infecțiilor severe. Luați comprimatele exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă nu sunteți sigur câte comprimate Ciprocin trebuie să luați sau cum să le luați.

- a. Înghițiți comprimatele cu mult lichid. Comprimatele nu trebuie mestecate deoarece nu au un gust plăcut.
- b. Încercați să luați comprimatele aproximativ la aceeași oră, în fiecare zi.
- c. Puteți lua comprimatele în timpul meselor sau între mese. Orice produse care conțin calciu ca parte a alimentației nu vor afecta în mod grav absorbția. Cu toate acestea, **nu** luați comprimate de Ciprocin cu produse lactate, cum sunt lapte sau iaurt sau cu sucuri de fructe cu suplimente (de exemplu suc de portocale cu supliment de calciu).

Amintiți-vă să beți multe lichide în timp ce luați Ciprocin.

#### **Dacă utilizați mai mult Ciprocin decât trebuie**

Dacă luați mai mult decât doza prescrisă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Dacă este posibil, luați cu dumneavoastră comprimatele sau cutia, pentru a le arăta medicului.

#### **Dacă uitați să utilizați Ciprocin**

Luați doza omisă cât mai curând posibil și apoi continuați tratamentul așa cum vi s-a prescris. Cu toate acestea, dacă se apropie timpul pentru următoarea doză, nu mai luați doza omisă ci continuați tratamentul ca de obicei. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Asigurați-vă că respectați durata completă a tratamentului.

#### **Dacă încetați să utilizați Ciprocin**

Este important să **respectați durata tratamentului** chiar dacă începeți să vă simțiți mai bine după câteva zile. Dacă încetați să luați acest medicament prea curând, este posibil ca infecția să nu se vindece complet și simptomele infecției pot să reapară sau se pot agrava. De asemenea puteți prezenta rezistență la antibiotic.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Puține persoane au dezvoltat reacții adverse foarte grave. Dacă observați unul dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

- Umflarea feței, mâinilor, buzelor, limbii sau gâtului, dificultăți de înghițire sau respirație.
- Mâncărimi severe ale pielii însoțite de vezicule și sângerări ale buzelor, pielii, nasului, gurii, ochilor și mucoaselor genitale
- Diaree severă, uneori cu sânge sau mucus
- Convulsii
- Senzație neobișnuită de durere, arsură, furnicături, amorțeală și/sau slăbiciune musculară la nivelul extremităților (neuropatie)- vezi secțiunea 2.
- Îngălbenirea pielii sau a ochilor, urină închisă la culoare, sensibilitate abdominală sau scădere în greutate

- Durere sau/și slăbiciune musculară, inflamație și durere în articulații, crampe musculare și creșterea tonusului muscular, inflamație și ruptură de tendoane, în special atunci când este afectat tendonul din spatele gleznei (tendonul Ahilean)- vezi secțiunea 2.

Dacă vederea vă este afectată sau dacă ochii par să fie afectați, consultați imediat un medic oftalmolog (consultați secțiunea 2: **Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ciprocin**).

Următoarele reacții adverse au fost raportate:

**Reacții adverse frecvente** (apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori):

- senzație de rău (greață), diaree
- durere articulară la copii.

**Reacții adverse mai puțin frecvente** (apar la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori):

- suprainfecții fungice
- număr crescut de eozinofile, un tip de celule albe sanguine
- pierderea poftelor de mâncare (anorexie)
- hiperactivitate sau agitație
- dureri de cap, amețeli, tulburări de somn sau tulburări de gust
- vărsături, dureri abdominale, tulburări digestive cum sunt probleme la nivelul stomacului (indigestie/arsuri) sau flatulență (gaze în intestin)
- creșterea concentrațiilor anumitor substanțe din sânge (transaminaze și/sau bilirubină)
- erupții ale pielii, mâncărimi sau urticarie
- dureri articulare la adulți
- afectarea funcției rinichiului
- durere la nivelul mușchilor sau oaselor, stare generală de rău (astenie) sau febră
- creșterea concentrațiilor fosfatazei alcaline din sânge (o anumită substanță în sânge).

**Reacții adverse rare** (apar la mai puțin de 1 din 1000 de utilizatori):

- inflamația intestinului (colită) legată de utilizarea antibioticului (în cazuri foarte rare poate pune viața în pericol) (vezi pct. 2)
- modificări ale numărului celulelor din sânge (leucopenie, leucocitoză, neutropenie, anemie), creșterea sau scăderea cantității unui factor de coagulare în sânge (trombocite)
- reacție alergică, umflături (edem) sau umflarea rapidă a pielii și a mucoaselor (edem angioneurotic)
- scăderea cantității de zahăr din sânge (hipoglicemie)(vezi secțiunea 2 “Atenționări și precauții”)
- creșterea cantității de zahăr din sânge (hiperglicemie)
- confuzie, dezorientare, reacții de anxietate, vise anormale, depresie sau halucinații
- senzație de furnicături, sensibilitate anormală la stimuli senzitivi, scăderea sensibilității la nivelul pielii, tremurături, crize convulsive (vezi pct. 2:) sau amețelă
- tulburări de vedere
- țiuțuri în urechi (tinitus), pierderea auzului, tulburări de auz
- bătăi rapide ale inimii (tahicardie)
- dilatarea vaselor de sânge (vasodilatație), scăderea presiunii sanguine sau leșin
- senzație de lipsă de aer, inclusiv simptome de astm bronșic
- tulburări de ficat, îngălbenirea pielii și a albului ochilor (icter colestatic) sau hepatită neinfecțioasă
- sensibilitate la lumină (vezi pct. 2)
- dureri musculare, inflamația articulațiilor, creșterea tonusului muscular sau crampe musculare
- insuficiență renală, prezența de sânge sau cristale în urină (vezi pct. 2), inflamația căilor urinare
- retenție de lichide sau transpirație excesivă
- creșterea valorilor enzimei amilază.

**Reacții adverse foarte rare** (apar la mai puțin de 1 din 10, 000 de utilizatori):

- un tip special de scădere a numărului de celule roșii (eritrocite) din sânge (anemie hemolitică), o scădere periculoasă a numărului unor anumite celule albe din sânge (agranulocitoză); scăderea numărului de celule roșii, albe și de trombocite din sânge (pancitopenie), care poate pune viața în pericol și afectarea măduvei osoase (aplazie medulară), care poate pune de asemenea viața în pericol (vezi pct. 2)
- reacții alergice severe (reacție anafilactică sau șoc anafilactic, care poate pune viața în pericol – boala serului) (vezi pct. 2)
- tulburări mentale (reacții psihotice) (vezi pct. 2)
- migrenă, tulburări de coordonare, mers instabil (tulburări ale mersului), tulburări de miros (tulburări olfactive), presiune la nivelul creierului (presiune intracraniană)
- tulburări în percepția culorilor
- inflamația pereților vaselor de sânge (vasculită)
- pancreatită
- moartea celulelor ficatului (necroză hepatică), ducând foarte rar la insuficiență hepatică care poate pune viața în pericol
- sângerări mici, punctiforme, sub piele (peteșii), urticarie sau diferite erupții pe piele (de exemplu sindrom Stevens-Johnson care poate pune viața în pericol sau necroliza epidermică toxică)
- slăbiciune musculară, inflamații ale tendoanelor, rupturi de tendoane – în special ale tendonului mare de pe partea posterioară a gleznei (tendonul lui Ahile) (vezi pct. 2); agravarea simptomelor miasteniei gravis (vezi pct. 2)

**Frecvență necunoscută** (nu poate fi estimată din datele disponibile)

- **stare de agitație extremă (manie) sau te simți hiperactiv și optimist (hipomanie)**
- probleme legate de sistemul nervos central, cum sunt durere, senzație de arsură, furnicăături, amorțeală și/sau slăbiciune la nivelul extremităților
- anomalii severe ale ritmului cardiac, bătăi neregulate ale inimii de tipul torsada vârfurilor
- erupție pustulară
- - influență asupra coagulării sângelui (la pacienții tratați cu antagoniști ai Vitaminei K)
- - sindrom asociat cu excreția de apă afectată și niveluri scăzute de sodiu (SIADH)

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **3. Cum se păstrează Ciprocin**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **4. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Ciprocin**



- Substanța activă este ciprofloxacina. Un comprimat filmat conține ciprofloxacina 250 mg sub formă de clorhidrat de ciprofloxacina.
- Celelalte componente sunt: *nucleu*-amidon de porumb, celuloză microcristalină, benzoat de sodiu, talc purificat, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal; *film*- hipromeloză 2910, macrogol 20000, dioxid de titan (E 171).

#### **Cum arată Ciprocin și conținutul ambalajului**

Se prezintă sub formă de comprimate filmate, rotunde, biconvexe, de culoare albă, cu diametrul de aproximativ 11,2 mm, inscripționate cu E171 pe una din fețe.

Este disponibil în cutii cu un blister din Al/PVC-PVDC a 10 comprimate filmate.

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

E.I.P.I.CO MED S.R.L

BUCUREȘTI, Sector 4, B dul Unirii, Nr. 6, Bloc 8C, Scara 1, Etaj 3, Ap. 9

Tel: 021/337 09 36

Fax: 021/337 11 91

#### **Responsabil cu eliberarea seriei produsului finit**

S.C. FELSIN FARM S.R.L.

Str. Drumul Piscul Cerbului nr. 20-28, Etaj P,  
camerele 1-9 și etaj, sector 1, București, România

#### **Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2019.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>

**Recomandări/educație sanitară**

Antibioticele sunt utilizate pentru tratamentul infecțiilor bacteriene. Ele nu sunt eficiente împotriva infecțiilor virale. Dacă medicul dumneavoastră v-a prescris antibiotice, aveți în mod sigur nevoie de acestea pentru tratamentul bolii dumneavoastră actuale. În pofida tratamentului cu antibiotice, unele bacterii pot supraviețui sau pot crește. Acest fenomen este numit rezistență: unele tratamente antibiotice devin ineficace.

Utilizarea inadecvată a antibioticelor crește rezistența. Dumneavoastră puteți chiar să ajutați bacteriile să devină rezistente și prin urmare să vă întârziati vindecarea sau să scădeți eficacitatea antibioticului, dacă nu urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră cu privire la:

- doza care trebuie luată
- cât de des trebuie să luați antibioticul
- durata tratamentului

**În consecință, pentru a menține eficacitatea acestui medicament:**

1. Utilizați antibiotice numai când vă sunt prescrise.
2. Urmați cu strictețe recomandările medicului.
3. Nu utilizați din nou un antibiotic fără o prescripție medicală, chiar dacă doriți să tratați o boală similară.
4. Nu dați niciodată antibioticul dumneavoastră unei alte persoane; este posibil ca antibioticul respectiv să nu fie adecvat pentru boala acestei persoane.
5. După terminarea tratamentului, înapoițați farmacistului toate medicamentele neutilizate, pentru a fi sigur că acestea sunt eliminate în mod corect.