

Prospect: Informații pentru utilizator**Herpexid 50 mg/g cremă**
Aciclovir

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este **Herpexid** și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați **Herpexid**
3. Cum să utilizați **Herpexid**
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează **Herpexid**
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Herpexid și pentru ce se utilizează

Herpexid face parte din grupa: chimioterapice de uz local, antivirale.

Herpexid este folosit pentru a trata ulcerațiile herpetice și alte infecții ale pielii determinate de virusul *herpes simplex*. Nu se va administra în ochi, în interiorul gurii sau al vaginului.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Herpexid**Nu utilizați Herpexid:**

- dacă sunteți alergic la aciclovir sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Atenționări și precauții

Anumite persoane nu ar trebui să folosească **Herpexid**. Întrebați-vă următoarele înainte de a folosi **Herpexid**:

- Sunteți gravidă, încercați să deveniți gravidă sau alăptați?
- Ați avut anterior o reacție alergică la aciclovir, valaciclovir, propilenglicol sau oricare dintre

componentele medicamentului?

Dacă răspunsul este **da** la oricare dintre aceste întrebări sau nu sunteți sigur de răspuns și nu le-ați discutat niciodată cu un doctor, informați medicul sau farmacistul înainte de a folosi medicamentul.

Acordați o atenție deosebită și consultați-vă cu medicul dumneavoastră, dacă:

- Aveți afecțiuni care vă pot slăbi sistemul imunitar, de exemplu o infecție cu virusul HIV, un transplant de măduvă osoasă sau urmați un tratament pentru cancer. În acest caz, o infecție a pielii poate fi mai serioasă pentru dumneavoastră decât pentru alte persoane.
- Nu sunteți sigur dacă aveți sau nu herpes.
- Herpesul de care sunteți afectat este foarte grav.
- Herpesul de care sunteți afectat nu s-a vindecat complet după 10 zile sau s-a agravat.

Nu utilizați **Herpexid**:

- Pentru alte infecții ale pielii decât herpes.
- Pentru a trata herpesul genital.
- În interiorul gurii (de exemplu pentru ulcere bucale) sau nasului.

Informați medicul dumneavoastră de fiecare dată când apar ulcerări herpetice. Nu vă tratați singur cu **Herpexid** decât dacă medicul vă recomandă aceasta.

Herpexid împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se așteaptă apariția interacțiunilor descrise pentru aciclovirul administrat sistemic.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu există date care să sugereze că aciclovirul influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Herpexid conține alcoolul cetostearilic.

Alcoolul cetostearilic din compoziția medicamentului poate provoca reacții adverse locale la nivelul pielii (de exemplu, dermatită de contact).

3. Cum să utilizați Herpexid

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Acest medicament este destinat doar pentru uz extern.

Spălați-vă de fiecare dată mâinile, înainte și după ce folosiți crema, pentru a evita agravarea sau transmiterea infecției.

Herpexid acționează cel mai bine atunci când este folosit de la primele semne ale bolii (furnicături sau mâncărime); se recomandă începerea tratamentului cât mai repede posibil. Dacă aceasta este prima infecție cu virus *herpes simplex*, folosiți imediat crema. Dacă apar umflături herpetice în mod regulat, începeți să folosiți crema imediat ce simțiți apariția uneia. Acestea se manifestă prin senzații de înțepături, prurit sau dureri ascuțite.

Aplicați un strat subțire de cremă pe aria afectată la fiecare trei-patru ore, în timpul zilei. Aceasta înseamnă de maxim 5 ori pe zi. Totuși, folosiți de fiecare dată crema așa cum v-a sfătuit medicul să faceți. Dacă tot nu sunteți sigur cum să folosiți crema, cereți sfatul medicului sau farmacistului.

Folosiți **Herpexid** pentru o perioadă de patru (4) zile. Dacă ulcerările nu s-au vindecat complet după patru (4) zile, folosiți cu atenție crema în continuare până la zece (10) zile de tratament, în total. Dacă ulcerările nu s-au vindecat după zece (10) zile, opriți folosirea cremei și informați medicul.

Aplicați suficientă cremă pentru a acoperi zona afectată, inclusiv marginile veziculelor dacă acestea sunt prezente.

Dacă simptomele dumneavoastră persistă mai mult de zece (10) zile, trebuie să consultați medicul.

Nu folosiți **Herpexid** în interiorul gurii sau al vaginului. Poate irita aceste zone. Totuși, **Herpexid** nu este toxic dacă este înghițit.

Nu folosiți crema pentru administrare la nivel ocular. Dacă ajunge totuși cremă la nivelul ochilor dumneavoastră, spălați cu multă apă rece. Dacă apar ulcerări sau sunteți îngrijorat informați medicul. Nu amestecați **Herpexid** cu alte loțiuni sau creme pentru piele.

Dacă utilizați mai mult Herpexid decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă se ingeră accidental conținutul unui tub adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Herpexid

Dacă ați uitat să utilizați o doză, aplicați-o imediat ce v-ați amintit. Totuși, dacă este timpul pentru administrarea următoarei doze, aplicați-o doar pe aceasta. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Herpexid

Adresați-vă mai întâi medicului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Unele persoane pot fi alergice/sensibile la **Herpexid**. Au existat cazuri rare de reacții alergice incluzând umflături în special ale buzelor, feței și/sau pleoapelor, înroșirea tegumentelor sau umflături dureroase ale pielii, urticarie. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, informați imediat medicul dumneavoastră și nu mai folosiți crema până când medicul sau farmacistul nu vă va spune să o faceți.

Herpexid poate determina înțepături sau senzație ușoară de arsură atunci când îl aplicați pentru prima dată. Anumite persoane își pot simți pielea uscată sau prea moale, pot avea senzații de înțepături ușoare sau pot observa înroșirea pielii. Dacă oricare dintre aceste reacții adverse vă supără, informați medicul.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Herpexid

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați **Herpexid** după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A se utiliza în cel mult 6 săptămâni de la prima deschidere a tubului.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Herpexid

- Substanța activă este aciclovirul. Un gram cremă conține aciclovir 50 mg.
- Celelalte componente sunt: alcool cetostearilic, vaselină albă, parafină lichidă, polisorbat 80, trolamină, alcool benzilic, apă purificată.

Cum arată Herpexid și conținutul ambalajului

Aciclovir Slavia se prezintă sub formă de masă semisolidă, omogenă, onctuoasă, de culoare albă.

Este disponibil în:

-Cutie cu un tub din aluminiu (Al), sigilat cu membrană din aluminiu (Al), închis cu capac cu filet din polietilenă de înaltă densitate (PEİD), prevăzut cu sistem de perforare a membranei; tubul conține 15 g cremă.

-Cutie cu un tub din aluminiu (Al) prevăzut cu aplicator de tip injector, închis cu capac cu filet din polietilenă de înaltă densitate (PEİD); tubul conține 5 g cremă.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C. Slavia Pharm S.R.L.

B-dul Theodor Pallady nr. 44C, cod 032266, București, România

Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2020.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania <http://www.anm.ro/>.