

Prospect: Informații pentru utilizator**Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml, spray bucofaringian, soluție**
Digluconat de clorhexidină/Clorhidrat de lidocaină**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3-4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cebangin mentol
3. Cum să utilizați Cebangin mentol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cebangin mentol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cebangin mentol și pentru ce se utilizează

Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml este un spray cu acțiune locală la nivelul cavității bucale și a faringelui.

Este un antiseptic și un analgezic local.

Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml este indicat pentru:

Tratamentul durerilor de gât, inflamației gâtului, tulburărilor faringiene și ale cavității bucale, însoțite de iritație, cum sunt inflamația gingiilor, mucoasei bucale și aftele.

În cazul unei infecții bacteriene însoțite de febră, este necesar tratament suplimentar.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cebangin mentol**Nu utilizați Cebangin mentol:**

- dacă sunteți alergic la gluconat de clorhexidină sau clorhidrat de lidocaină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);

-la copii cu vârsta sub 6 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Cebangin **mentol**, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Copii

Nu administrați acest medicament la copii cu vârsta sub 6 ani.

Cebangin mentol împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu utilizați simultan alți dezinfectanți.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Cebangin **mentol** 2 mg/0,5 mg/ml conține alcool. Vă rugăm să citiți, de asemenea pct. „Cebangin **mentol** 2 mg/0,5 mg/ml conține alcool”

Dacă sunt respectate precauțiile de mai sus, Cebangin **mentol** 2 mg/0,5 mg/ml poate fi utilizat în timpul sarcinii și alăptării. Informați-l pe medicul dumneavoastră dacă utilizați acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml conține 29,7 vol% etanol (alcool) de exemplu până la 108 mg per 5 pufuri, echivalent cu 2,7 ml bere sau 1,1 ml vin per 5 sprayuri. Acest lucru este dăunător pentru persoanele cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide, cele care alăptează, copii și persoanele cu risc precum cei cu afecțiuni hepatice sau epilepsie.

3. Cum să utilizați Cebangin mentol

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Acest medicament nu trebuie utilizat pe perioade lungi de timp. Dacă nu apare nicio ameliorare timp de 3 - 4 zile de tratament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Doza recomandată este:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 3-5 pufuri o dată, de 6-10 ori pe zi

Copii cu vârsta peste 6 ani: 2-3 pufuri o dată, de 3-5 ori pe zi

Dacă utilizați mai mult Cebangin mentol decât trebuie

Acest medicament conține numai o parte din doza toxică. Dacă este utilizat în mod corespunzător, riscurile de supradozaj sunt foarte mici.

Simptomele supradozajului sunt: neliniște, tinitus, dificultate a respirației, tulburare a ritmului cardiac, control redus al reflexului de înghițire.

Dacă uitați să utilizați Cebangin mentol

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Dacă încetați să utilizați Cebangin mentol

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Foarte rare: reacții alergice ale pielii și mucoaselor.

În mod excepțional, pot apărea tulburări ale gustului, o senzație de iritare pe limbă și reacții alergice severe (reacții anafilactice).

În cazul administrării prelungite și neîntrerupte, poate apărea colorarea dinților în maro. Totuși, culoare maronie este ușor de îndepărtat.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cebangin mentol

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie/etichetă după „EXP”. Primele două cifre indică luna, următoarele două sau patru indică anul. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. Spray-ul poate fi folosit 3 luni de la deschidere.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Cebangin mentol

- Substanțele active sunt digluconat de clorhexidină soluție și clorhidrat de lidocaină monohidrat.
- O doză eliberată = un puf, corespunde la 85μl soluție, care conține 0,90 mg digluconat de clorhexidină soluție (echivalent la 0,17 mg digluconat de clorhexidină) și 0,04 mg clorhidrat de lidocaină monohidrat.
- Celelalte componente sunt: Acid citric monohidrat, glicerol, zaharină sodică (E954), levomentol, cineol, etanol, apă purificată.

Cum arată Cebangin mentol și conținutul ambalajului

Soluție limpede, incoloră, cu miros de mentă și alcool.

Cutie cu un flacon din sticlă brună, tip III, prevăzut cu pompă de pulverizare care conține 30 ml spray bucofaringian, soluție.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

CEBIS International SRL România

Calea Plevnei, nr. 222, sector 6, 060016, București, România

Fabricant :

LABORATORIA QUALIPHAR NV
Rijksweg 9, 2880 Bornem, Belgia

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2020.
Alte surse de informații

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>