

16663/2026/01-02-03-04-05

16664/2026/01-02-03-04-05

16665/2026/01-02-03-04-05

16666/2026/01-02-03-04-05

16667/2026/01-02-03-04-05

16668/2026/01-02-03-04-05

### Prospect: Informații pentru pacient

**Atomoxetină AmaroX 10 mg capsule**  
**Atomoxetină AmaroX 18 mg capsule**  
**Atomoxetină AmaroX 25 mg capsule**  
**Atomoxetină AmaroX 40 mg capsule**  
**Atomoxetină AmaroX 60 mg capsule**  
**Atomoxetină AmaroX 80 mg capsule**  
**Atomoxetină AmaroX 100 mg capsule**

atomoxetină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră sau pentru copilul dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca al dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Atomoxetină AmaroX și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Atomoxetină AmaroX
3. Cum să luați Atomoxetină AmaroX
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Atomoxetină AmaroX
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Atomoxetină AmaroX și pentru ce se utilizează**

##### **Pentru ce se utilizează**

Atomoxetină AmaroX conține atomoxetină și este utilizată în tratamentul tulburării prin deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD). Este utilizată la copii cu vârsta peste 6 ani, la adolescenți și la adulți.

Este utilizată numai ca parte integrantă dintr-un tratament complet al bolii care necesită de asemenea și terapii care nu implică administrarea de medicamente, cum sunt consilierea și terapia comportamentală.

Nu este indicat ca tratament pentru ADHD la copii cu vârsta sub 6 ani deoarece nu se cunoaște dacă medicamentul are efect sau dacă poate fi administrat în siguranță la acești pacienți.

În cazul adulților, Atomoxetină AmaroX este utilizată în tratamentul ADHD atunci când simptomele sunt foarte supărătoare și vă afectează munca sau viața socială și atunci când ați avut simptomele acestei boli în copilărie.

## **Cum funcționează**

Atomoxetină AmaroX crește cantitatea de noradrenalină din creier. Aceasta este o substanță chimică care este produsă în mod natural și crește atenția și scade impulsivitatea și hiperactivitatea la pacienții cu ADHD. Acest medicament a fost prescris pentru a facilita controlul simptomelor ADHD. Acest medicament nu este un stimulant și, prin urmare, nu dă dependență.

Poate dura câteva săptămâni după începerea tratamentului până la îmbunătățirea completă a simptomelor dumneavoastră.

## **Despre ADHD**

Copiii și tinerii cu ADHD le este dificil să stea liniștiți și să se concentreze. Nu este vina lor că nu pot face aceste lucruri. Numeroși copii și tineri întâmpină dificultăți în acest sens.

Cu toate acestea, în cazul ADHD, acestea pot cauza probleme în viața de zi cu zi. Copiii și tinerii cu ADHD pot prezenta dificultăți în a învăța și în a-și face temele. Le este greu să se comporte în mod ordonat acasă, la școală sau în alte locuri. ADHD nu afectează inteligența unui copil sau unui tânăr.

Adulților cu ADHD le este dificil să facă toate lucrurile pe care copiii le consideră dificile, cu toate acestea, acest aspect poate indica faptul că aceștia au probleme cu serviciul, relațiile, stima de sine scăzută și cu educația.

## **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Atomoxetină AmaroX**

### **Nu luați Atomoxetină AmaroX**

- dacă sunteți alergic la atomoxetină sau oricare dintre componentele acestui medicament (enumerat la pct. 6).
- dacă ați luat un medicament denumit inhibitor de monoaminoxidază (IMAO), de exemplu fenelzină, în timpul ultimelor două săptămâni. Un medicament IMAO se utilizează, uneori, în tratamentul depresiei sau în alte probleme de sănătate mintală; administrarea Atomoxetină AmaroX împreună cu un IMAO poate să determine reacții adverse grave sau să pună viața în pericol. (De asemenea, va trebui să așteptați cel puțin 14 zile după ce întrerupeți tratamentul cu Atomoxetină AmaroX pentru a putea începe să luați un IMAO).
- dacă aveți o boală a ochilor denumită glaucom cu unghi îngust (presiune crescută la nivelul ochilor).
- dacă aveți probleme serioase cu inima ce pot fi afectate de creșterea ritmului de bătaie al inimii și/sau a tensiunii arteriale, deoarece acestea pot fi efecte ale Atomoxetină AmaroX
- dacă aveți probleme serioase cu vasele de sânge de la nivelul creierului - cum este un accident vascular cerebral, umflarea sau subțierea unei porțiuni a unui vas de sânge (anevrism) sau vase de sânge îngustate sau înfundate.
- dacă aveți o tumoră a glandei suprarenale (feocromocitom).

Nu luați Atomoxetină AmaroX dacă cele menționate anterior se aplică în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur, adresați-vă medicului sau farmacistului dumneavoastră înainte de a lua Atomoxetină AmaroX, deoarece Atomoxetină AmaroX poate agrava aceste probleme.

### **Atenționări și precauții**

Atât adulții cât și copiii trebuie să fie avertizați cu privire la următoarele atenționări și precauții. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Atomoxetină AmaroX dacă aveți:

- gânduri suicidare sau ați încercat să vă sinucideți.
- probleme cu inima (incluzând defecte ale structurii inimii) sau bătaie rapidă ale inimii. Atomoxetină AmaroX poate să vă accelereze ritmul de bătaie al inimii (puls). La pacienții cu defecte de structură a inimii au fost raportate cazuri de moarte subită.
- tensiune arterială mare. Atomoxetină AmaroX poate să crească tensiunea arterială.
- tensiune arterială mică. Atomoxetină AmaroX poate să determine amețeli sau leșin la persoanele cu tensiune arterială mică.
- probleme cu schimbări bruște ale tensiunii arteriale sau ale ritmului de bătaie al inimii.
- o boală cardiovasculară sau un istoric de accident vascular cerebral.

- probleme cu ficatul. S-ar putea să aveți nevoie de o doză mai mică.
- simptome psihotice incluzând halucinații (auziți voci sau vedeți lucruri care nu sunt reale), credeți în lucruri care nu sunt adevărate sau sunteți suspicios.
- suferiți de manie (senzația de euforie sau de hiperexcitare care determină un comportament neobișnuit) și agitație.
- sentimente agresive.
- sentimente de furie și iritare (ostilitate).
- un istoric de epilepsie sau ați avut convulsii, de orice altă cauză. Atomoxetină AmaroX poate determina o creștere a frecvenței convulsiilor.
- dispoziții diferite de dispoziția obișnuită (tulburări de dispoziție) sau vă simțiți foarte nefericit.
- spasme greu de controlat și repetate ale unor părți ale corpului sau repetați sunete sau cuvinte.

### Sindrom serotoninergic

Sindromul serotoninergic este o afecțiune care poate pune viața în pericol și care poate apărea atunci când se administrează Atomoxetină AmaroX concomitent cu alte medicamente (vezi pct. 2 "Alte medicamente și Atomoxetină AmaroX"). Semnele și simptomele sindromului serotoninergic pot include o combinație a următoarelor: confuzie, neliniște, lipsă de coordonare și rigiditate, halucinații, comă, bătăi rapide ale inimii, creștere a temperaturii corpului, modificări rapide ale tensiunii arteriale, transpirații, înroșire a feței, tremor, reflexe hiperactive, greață, vărsături și diaree. Contactați un medic sau mergeți imediat la departamentul de urgență al celui mai apropiat spital dacă credeți că aveți manifestări ale sindromului serotoninergic.

Tratamentul cu Atomoxetină AmaroX vă poate face să vă simțiți agresiv, ostil sau violent; sau agravează aceste simptome dacă au fost prezente înainte de tratament. De asemenea, vă poate provoca modificări neobișnuite ale comportamentului sau dispoziției (inclusiv agresivitate fizică, comportament amenințător și gânduri de a face rău altora). Dacă dumneavoastră sau familia și/sau prietenii dumneavoastră observați oricare dintre aceste reacții, discutați imediat cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă prezentați una dintre problemele de mai sus înainte de a începe tratamentul, deoarece Atomoxetină AmaroX poate agrava aceste probleme. Medicul dumneavoastră va monitoriza modul în care medicamentul vă afectează.

### **Verificări pe care medicul dumneavoastră le va efectua înainte a inițierea tratamentului cu Atomoxetină AmaroX**

Aceste verificări vor ajuta medicul să decidă dacă Atomoxetină AmaroX este medicamentul corect pentru dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va măsura:

- tensiunea arterială și ritmul de bătaie al inimii (puls) înainte și pe durata tratamentului cu Atomoxetină AmaroX
- înălțimea și greutatea în cazul în care sunteți un copil sau un adolescent, pe durata tratamentului cu Atomoxetină AmaroX

Medicul dumneavoastră vă va vorbi despre:

- orice alte medicamente pe care le luați
- istoricul familial de morți subite fără cauză cunoscută
- oricare alte probleme medicale (cum sunt problemele de inimă) pe care le-ați avut dumneavoastră sau membrii familiei dumneavoastră.

Este important să oferiți cât mai multe informații cu putință. Acestea îl vor ajuta pe medicul dumneavoastră să decidă dacă Atomoxetina Zentiva este medicamentul corect pentru dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră poate să decidă că sunt necesare și alte teste medicale înainte de a începe să luați acest medicament.

### **Atomoxetină AmaroX împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Acestea includ și medicamentele eliberate fără prescripție medicală. Medicul dumneavoastră va decide dacă puteți să luați Atomoxetină AmaroX împreună cu celelalte medicamente și, în unele cazuri, medicul dumneavoastră va trebui să vă ajusteze doza sau să o crească mult mai lent.

Atomoxetină AmaroX poate influența sau poate fi influențat de alte medicamente. Acestea includ:  
- Unele antidepresive, opioide precum tramadolul și medicamente utilizate pentru tratarea migrenei numite triptani. Aceste medicamente pot interacționa cu <Numele inventat> și pot duce la sindrom serotoninergic, o afecțiune care poate pune viața în pericol. (Vezi pct. 2, Atenționări și precauții, Sindrom serotoninergic).

Nu luați Atomoxetină AmaroX împreună cu IMAO (inhibitori de monoaminoxidază) utilizați în tratamentul depresiei Vezi pct. 2 “Nu luați Atomoxetină AmaroX”.

Dacă luați alte medicamente, Atomoxetină AmaroX poate afecta acțiunea acestora sau poate cauza reacții adverse. Dacă luați oricare dintre următoarele medicamente, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Atomoxetină AmaroX:

- Medicamente care cresc tensiunea arterială sau care sunt utilizate pentru controlul tensiunii arteriale.
- Medicamente precum antidepresivele, de exemplu imipramina, venlafaxina, mirtazapina, fluoxetina și paroxetina.
- Unele antidepresive, opioide ca tramadol și medicamente utilizate pentru tratarea migrenei numite triptani. Aceste medicamente pot interacționa cu Atomoxetină AmaroX și pot duce la apariția sindromului serotoninergic, o afecțiune care poate pune viața în pericol. (Vezi pct. 2, Atenționări și precauții, Sindrom serotoninergic).
- Anumite remedii pentru tuse și răceală care conțin medicamente care vă pot afecta tensiunea arterială. Este important să discutați cu farmacistul atunci când primiți oricare dintre aceste medicamente.
- Anumite medicamente utilizate pentru tratamentul unor afecțiuni de sănătate mintală.
- Medicamente care sunt cunoscute a crește riscul de convulsii.
- Unele medicamente care fac ca Atomoxetina Zentiva să rămână în organism mai mult decât este normal (cum sunt chinidina și terbinafina).
- Salbutamol (un medicament utilizat pentru tratamentul astmului bronșic) atunci când este administrat pe cale orală sau injectat vă poate face să simțiți că inima vă bate foarte repede, dar acest lucru nu vă va agrava astmul.

Următoarele medicamente enumerate mai jos pot duce la creșterea riscului de ritm neobișnuit de bătaie al inimii atunci când sunt luate împreună cu Atomoxetină AmaroX:

- medicamente folosite pentru a controla ritmul inimii,
- medicamente care modifică concentrația de săruri din sânge,
- medicamente pentru prevenirea și tratamentul malariei,
- anumite antibiotice (cum sunt eritromicina și moxifloxacină).

Dacă nu sunteți sigur dacă medicamentele pe care le luați sunt incluse în lista de mai sus, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua Atomoxetină AmaroX.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, cereți sfatul medicului sau farmacistului înainte să luați acest medicament.

Nu se știe dacă acest medicament poate afecta copilul nenăscut sau dacă trece în laptele matern.

Acest medicament nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, decât cu recomandarea medicului dumneavoastră.

De asemenea, trebuie să evitați să luați acest medicament dacă alăptați sau să întrerupeți alăptarea.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

S-ar putea să vă simțiți obosit, somnolent sau amețit după ce luați Atomoxetină AmaroX. Trebuie să fiți atent(ă) când conduceți automobilul sau lucrați cu utilaje, până când veți ști în ce mod vă afectează Atomoxetină AmaroX. Dacă vă simțiți obosit, somnolent sau amețit nu trebuie să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje.

### **Informații importante despre conținutul capsulelor**

Nu deschideți capsulele de Atomoxetină AmaroX deoarece conținutul capsulei poate irita ochii. Dacă conținutul capsulei ajunge în contact cu ochii, ochiul afectat trebuie spălat imediat cu apă din abundență și este necesar consult medical. Măinile sau oricare parte a corpului care vine în contact cu conținutul capsulei trebuie, de asemenea, spălate cât mai curând posibil.

### **Atomoxetină AmaroX conține sodiu**

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per capsule, adică practic „nu conține sodiu”.

### **3. Cum să luați Atomoxetină AmaroX**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Atomoxetină AmaroX se administrează de obicei o dată sau de două ori pe zi (dimineața și spre sfârșitul după-amiezii sau la începutul serii).

Copiii nu trebuie să ia acest medicament fără ajutor din partea unui adult.

Dacă luați Atomoxetină AmaroX o dată pe zi și prezentați somnolență sau greață, medicul dumneavoastră vă poate modifica tratamentul la două administrări pe zi.

Capsulele trebuie înghițite întregi, cu sau fără mâncare.

Capsulele nu trebuie desfăcute și conținutul capsulei nu trebuie golit sau administrat în orice alt mod. Utilizarea acestui medicament la aceeași oră în fiecare zi vă poate ajuta să vă amintiți mai bine să îl luați.

### **Cât să luați**

#### Dacă sunteți copil sau adolescent (cu vârsta de 6 ani și peste)

Medicul dumneavoastră vă va spune cât Atomoxetină AmaroX să luați și vă va calcula doza în funcție de greutatea dumneavoastră. În mod normal, medicul vă va iniția tratamentul cu o doză mai mică, iar apoi va crește doza de Atomoxetină AmaroX pe care trebuie să o luați, în funcție de greutatea dumneavoastră corporală.

- Greutate până la 70 kg: o doză zilnică inițială totală de 0,5 mg pe kg de greutate corporală, timp de minim 7 zile. Medicul dumneavoastră poate decide, mai apoi, să vă crească doza, până la doza uzuală zilnică de întreținere de aproximativ 1,2 mg pe kg de greutate corporală.
- Greutate mai mare de 70 kg: o doză zilnică inițială totală de 40 mg timp de minim 7 zile. Ulterior, medicul dumneavoastră poate decide să vă crească doza, până la doza uzuală zilnică de întreținere de 80 mg. Doza zilnică maximă pe care v-o poate recomanda medicul dumneavoastră este 100 mg.

#### Adulți

Tratamentul cu Atomoxetină AmaroX trebuie să fie inițiat cu o doză zilnică totală de 40 mg timp de minim 7 zile. Ulterior, medicul dumneavoastră poate decide să vă crească doza, până la doza uzuală zilnică de întreținere de 80 mg - 100 mg.

Doza maximă zilnică pe care medicul dumneavoastră v-o poate prescrie este de 100 mg.

Dacă aveți probleme cu ficatul dumneavoastră, medicul dumneavoastră vă poate recomanda o doză mai scăzută.

### **Dacă luați mai multă Atomoxetină AmaroX decât trebuie**

Dacă luați mai mult decât doza prescrisă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la departamentul de urgență al celui mai apropiat spital și spuneți-le câte capsule ați luat. Simptomele

raportate cel mai frecvent, asociate supradozajului, sunt simptome gastrointestinale, somnolență, amețeli, tremor și comportament neobișnuit. Foarte rar, a fost raportat sindrom serotoninergic, o afecțiune care pune viața în pericol. (Vezi pct. 2, Atenționări și precauții, Sindrom serotoninergic).

#### **Dacă uitați să luați Atomoxetină AmaroX**

Dacă nu ați luat o doză, trebuie să o luați cât mai curând posibil, dar nu trebuie să luați în 24 de ore mai mult decât doza dumneavoastră zilnică totală. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă încetați să luați Atomoxetină AmaroX**

În mod normal, dacă întrerupeți administrarea Atomoxetină AmaroX, nu apar reacții adverse, însă este posibil ca simptomele ADHD să reapară. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a întrerupe tratamentul.

#### **Măsuri pe care medicul dumneavoastră le va lua în timpul tratamentului dumneavoastră**

Medicul dumneavoastră va realiza anumite teste:

- înainte de a începe tratamentul - pentru a se asigura că Atomoxetină AmaroX este sigur și veți avea un beneficiu.
- după începerea tratamentului – acestea vor fi realizate la cel puțin fiecare 6 luni, însă posibil mai des.

De asemenea, acestea vor fi efectuate la schimbarea dozei. Printre aceste teste se numără:

- măsurarea înălțimii și greutateii la copii și tineri,
- măsurarea tensiunii arteriale și a ritmului de bătaie al inimii,
- se verifică dacă aveți probleme sau dacă reacțiile adverse s-au înrăutățit în timp ce utilizați Atomoxetină AmaroX.

#### **Tratament pe termen lung**

Tratamentul cu Atomoxetină AmaroX nu trebuie urmat pe o perioadă nedeterminată de timp. Dacă luați Atomoxetină AmaroX timp de peste 1 an, medicul dumneavoastră va efectua o reevaluare a tratamentului pentru a determina dacă medicamentul este necesar.

Dacă aveți întrebări suplimentare adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu toate că anumite persoane au reacții adverse, majoritatea persoanelor consideră că Atomoxetină AmaroX le este de ajutor. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră despre aceste reacții adverse.

Anumite reacții adverse pot fi grave. **Trebuie să luați imediat legătura cu medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse.**

#### **Mai puțin frecvente** (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

- senzație de bătăi rapide ale inimii sau existența bătăilor rapide ale inimii, ritm neobișnuit de bătaie al inimii
- gânduri despre sau sentimentul că vreți să vă sinucideți
- agresiune
- sentimente de neprietenie și furie (ostilitate)
- tulburări de dispoziție sau schimbări ale dispoziției
- reacție alergică gravă cu simptome de:
  - umflare a feței și gâtului
  - dificultăți în respirație
  - urticarie (pete mici, reliefate pe piele, însoțite de senzație de mâncărime)

- crize convulsive
- simptome psihotice incluzând halucinații (cum sunt auzirea unor voci sau vederea unor lucruri care nu există în realitate), credeți în lucruri care nu sunt adevărate sau deveniți suspicios

**Copiii și tinerii cu vârsta sub 18 ani au un risc crescut de reacții adverse cum sunt:**

- gânduri despre sau sentimentul că vreți să vă sinucideți (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)
- tulburări de dispoziție sau schimbări ale dispoziției (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

**Adulții prezintă un risc redus (pot afecta până la 1 din 1000 persoane) de reacții adverse cum ar fi:**

- crize convulsive
- simptome psihotice, incluzând halucinații (cum sunt auzirea unor voci sau vederea unor lucruri care nu există în realitate), credeți în lucruri care nu sunt adevărate sau deveniți suspicios.

**Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):**

- afectări ale ficatului.

**Trebuie să opriți administrarea Atomoxetină Amaroș și să luați imediat legătura cu medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele manifestări:**

- urină închisă la culoare
- piele galbenă sau îngălbenire a albului ochilor
- durere abdominală care se accentuează când apăsați (sensibilitate) sub marginea coastelor, pe partea dreaptă
- o senzație de rău (greață) inexplicabilă
- oboseală
- mâncărimi
- senzație că o să răciți.

**Alte reacții adverse raportate includ următoarele. Dacă acestea devin grave, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.**

| Reacții adverse <b>foarte frecvente</b> (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane)   |   |
|--|---|
| <b>COPII și TINERI cu vârsta peste 6 ani</b>   | <b>ADULȚI</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durere de cap</li> <li>• durere la nivelul stomacului</li> <li>• scăderea poftei de mâncare (absența senzației de foame)</li> <li>• greață</li> <li>• vărsături</li> <li>• somnolență</li> <li>• tensiune arterială mare</li> <li>• ritm crescut de bătaie al inimii (puls)</li> </ul> <p>Aceste efecte pot să dispară după un timp la majoritatea pacienților.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• greață, gură uscată</li> <li>• dureri de cap</li> <li>• scăderea poftei de mâncare (absența senzației de foame)</li> <li>• probleme în a adormi, a rămâne adormit și trezirea foarte dimineată</li> <li>• tensiune arterială crescută</li> <li>• frecvență cardiacă crescută (puls)</li> </ul> |

| Reacții adverse <b>frecvente</b> (pot afecta până la 1 din 10 persoane)   |  |
|---|--|
| <b>COPII și TINERI cu vârsta peste 6 ani</b>  | <b>ADULȚI</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• iritabilitate sau agitație</li> <li>• probleme cu somnul inclusiv trezitul foarte devreme dimineată</li> <li>• depresie</li> <li>• stare de tristețe sau de pierdere a speranței</li> <li>• stări anxioase</li> <li>• ticuri</li> <li>• pupile mărite (centrul întunecat al ochiului)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• agitație</li> <li>• scăderea interesului față de sex</li> <li>• probleme cu somnul</li> <li>• depresie</li> <li>• stare de tristețe sau de pierdere a speranței</li> <li>• stări anxioase</li> <li>• amețală</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• amețeală</li> <li>• constipație</li> <li>• pierderea apetitului alimentar</li> <li>• tulburări gastrice, indigestie</li> <li>• umflături, înroșire sau mâncărimi la nivelul pielii</li> <li>• erupție trecătoare pe piele</li> <li>• senzație de lene (letargie)</li> <li>• durere în piept</li> <li>• oboseală</li> <li>• scădere în greutate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gust neobișnuit sau modificări ale gustului care persistă</li> <li>• tremor</li> <li>• furnicături sau amorțeală la nivelul mâinilor și picioarelor</li> <li>• somnolență, moleșală, senzație de oboseală</li> <li>• constipație</li> <li>• durere de stomac</li> <li>• indigestie</li> <li>• balonare</li> <li>• vărsături</li> <li>• bufeuri sau roșeață</li> <li>• senzație de bătaii rapide ale inimii sau existența de bătaii rapide ale inimii</li> <li>• umflături, înroșire sau mâncărimi la nivelul pielii</li> <li>• transpirație în exces</li> <li>• erupție trecătoare pe piele</li> <li>• dificultăți la mersul la toaletă, de exemplu, incapacitatea de a urina, urinare frecventă sau ezitare la urinat, durere la urinare</li> <li>• inflamația prostatei la bărbați (prostatită)</li> <li>• durere în zona inghinală la bărbați</li> <li>• incapacitatea de a obține o erecție</li> <li>• orgasm întârziat</li> <li>• dificultăți în menținerea erecției</li> <li>• crampe menstruale</li> <li>• lipsă de putere și energie</li> <li>• oboseală</li> <li>• senzație de lene (letargie)</li> <li>• frisoane</li> <li>• iritabilitate, nervozitate</li> <li>• senzație de sete</li> <li>• scădere în greutate</li> </ul> |
|--|--|

| Reacții adverse <b>mai puțin frecvente</b> (pot afecta până la 1 din 100 persoane)  |   |
|---|---|
| <b>COPII și TINERI cu vârsta peste 6 ani</b>  | <b>ADULȚI</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• leșin</li> <li>• tremor</li> <li>• migrenă</li> <li>• vedere încețoșată</li> <li>• senzații neobișnuite la nivelul pielii, de exemplu arsură, înțepături, mâncărimi sau furnicături</li> <li>• furnicături sau amorțeală la nivelul mâinilor și picioarelor</li> <li>• convulsii (crize)</li> <li>• senzație de bătaii rapide ale inimii sau existența bătailor rapide ale inimii (prelungirea intervalului QT)</li> <li>• dificultăți la respirat</li> <li>• transpirație abundentă</li> <li>• mâncărimi la nivelul pielii</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• neliniște</li> <li>• ticuri</li> <li>• leșin</li> <li>• migrenă</li> <li>• vedere încețoșată</li> <li>• bătaii neobișnuite ale inimii (prelungirea intervalului QT)</li> <li>• senzație de rece în degetele de la mâini și de la picioare</li> <li>• durere în piept</li> <li>• dificultăți la respirat</li> <li>• erupție pe piele reliefată, însoțită de mâncărime (urticarie)</li> <li>• spasme musculare</li> <li>• nevoie puternică de a urina</li> <li>• orgasm neobișnuit sau absența orgasmului</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>lipsă de putere sau de energie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>menstruație neregulată</li> <li>incapacitate de a ejacula</li> </ul> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)</b>  |  |
| <b>COPII și TINERI cu vârsta peste 6 ani</b>  | <b>ADULȚI</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>circulație deficitară a sângelui care face degetele de la mâini și de la picioare să fie lipsite de sensibilitate și palide (Sindrom Raynaud)</li> <li>dificultăți la mersul la toaletă, cum este urinarea frecventă sau ezitare la inițierea urinării, durere la urinare</li> <li>erecții prelungite și dureroase</li> <li>durere în zona inghinală la bărbați</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>circulație deficitară a sângelui care face degetele de la mâini și de la picioare să fie lipsite de sensibilitate și palide (Sindrom Raynaud)</li> <li>erecții prelungite și dureroase</li> </ul> |
| <b>Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)</b>   |  |
| <b>COPII cu vârsta peste 6 ani și TINERI</b>  |  |
| Scrâșnitul involuntar al dinților (bruxism)   |  |

### Efecte asupra creșterii

Unii copii prezintă o creștere redusă (în greutate și în înălțime) atunci când încep să utilizeze Atomoxetină AmaroX. Cu toate acestea, în cazul tratamentului pe termen lung, copiii revin la greutatea și înălțimea corespunzătoare grupei lor de vârstă.

Medicul dumneavoastră va monitoriza înălțimea și greutatea copilului dumneavoastră în timp. În cazul în care copilul dumneavoastră nu crește în înălțime sau nu ia în greutate conform așteptărilor, medicul dumneavoastră poate modifica doza copilului dumneavoastră sau poate decide întreruperea temporară a tratamentului cu Atomoxetină AmaroX.

### Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România  
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### 5. Cum se păstrează Atomoxetină AmaroX

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### 6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### Ce conține Atomoxetină AmaroX

Substanța activă este clorhidratul de atomoxetină.

Fiecare capsulă conține clorhidrat de atomoxetină echivalent cu atomoxetină 10 mg.  
Fiecare capsulă conține clorhidrat de atomoxetină echivalent cu atomoxetină 18 mg.  
Fiecare capsulă conține clorhidrat de atomoxetină echivalent cu atomoxetină 25 mg.  
Fiecare capsulă conține clorhidrat de atomoxetină echivalent cu atomoxetină 40 mg.  
Fiecare capsulă conține clorhidrat de atomoxetină echivalent cu atomoxetină 60 mg.  
Fiecare capsulă conține clorhidrat de atomoxetină echivalent cu atomoxetină 80 mg.  
Fiecare capsulă conține clorhidrat de atomoxetină echivalent cu atomoxetină 100 mg.

cei alți excipienți sunt: amidon de porumb pregelatinizat, dimeticonă, stearat de magneziu, dioxid de titan (E 171), gelatină, cerneală neagră (Șelac, oxid negru de fer (E 172), propilenglicol, aminiac soluție concentrată, hidroxid de potasiu).

Atomoxetină AmaroX 18 mg: oxid galben de fer (E 172).

Atomoxetină AmaroX 25 și 40 mg: Albastru FD&C (E132).

### **Cum arată Atomoxetină AmaroX și conținutul ambalajului**

#### Atomoxetină AmaroX 10 mg capsule

Capsule gelatinoase tari, de culoare albă opac/alb opac, mărimea „5”, imprimate cu „I” pe capac și „105” pe corp, umplute cu pulbere granulară de culoare albă până la alb-gălbuie.

#### Atomoxetină AmaroX 18 mg capsule

Capsule gelatinoase tari, de culoare galben/alb opacă, mărimea „4”, imprimate cu „I” pe capac și „106” pe corp, umplute cu pulbere granulară de culoare albă până la alb-gălbuie.

#### Atomoxetină AmaroX 25 mg capsule

Capsule gelatinoase tari, de culoare albastru/alb opac, mărimea „3”, imprimate cu „I” pe capac și „107” pe corp, umplute cu pulbere granulară de culoare albă până la alb-gălbuie.

#### Atomoxetină AmaroX 40 mg capsule

Capsule gelatinoase tari, de culoare albastru opac/alb opac, mărimea „2”, imprimate cu „I” pe capac și „108” pe corp, umplute cu pulbere granulară de culoare albă până la alb-gălbuie.

#### Atomoxetină AmaroX 60 mg capsule

Capsule de gelatină tari, de culoare albastru opac/galben, mărimea „2”, imprimate cu „I” pe capac și „109” pe corp, umplute cu pulbere granulară de culoare albă până la alb-gălbuie.

#### Atomoxetină AmaroX 80 mg capsule

Capsule de gelatină tari, de culoare maro opac/alb-opac, mărimea „2”, imprimate cu „I” pe capac și „110” pe corp, umplute cu pulbere granulară de culoare albă până la alb-gălbuie.

#### Atomoxetină AmaroX 100 mg capsule

Capsule de gelatină tari, de culoare maro opac/maro opac, mărimea „1”, imprimate cu „I” pe capac și „111” pe corp, umplute cu pulbere granulară de culoare albă până la alb-gălbuie.

Capsulele Atomoxetină AmaroX sunt disponibile în blistere care conțin 7, 28, 30, 56 și 98 de capsule tari.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

AmaroX Pharma B.V.

Rouboslaan 32

2252TR Voorschoten

Țările de Jos

**Acest prospect a fost revizuit în mai 2026.**