PROSPECT
Prospect: Informaţii pentru utilizator

SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM soluţie perfuzabilă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM
3. Cum să utilizaţi SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM şi pentru ce se utilizează

Soluţia Ringer Stada Hemofarm soluţie perfuzabilă conţine substanţele active clorură de sodiu, clorură de calciu dihidrat, clorură de potasiu şi face parte din grupul de medicamente soluţii perfuzabile pentru dezechilibre hidroelectrolitice.

Indicaţii terapeutice:
Soluţia Ringer Stada Hemofarm este indicată ca tratament de substituţie hidroelectrolitică în:
- deshidratări predominant extracelulare (de exemplu în caz de vărsături, diaree, fistule);
- hipovolemie (determinată de şoc hemoragic, arsuri, pierderi hidroelectrolitice perioperatorii).

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM

Nu utilizaţi SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM
- dacă sunteţi alergic la substanţele active sau la oricare dintre celelalte component ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).
- insuficienţă cardiacă congestivă;
- hiperhidratare, predominant extracelulară;

- hiperkaliemie, hipercalcemie;
- asociere cu digitalice şi diuretice care economisesc potasiu.

Atenţionări şi precauţii
Înainte să utilizaţi Soluţia Ringer Stada Hemofarm adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Această soluţie nu trebuie administrată prin injectare intramusculară. În caz de transfuzii concomitente, sângele şi Soluţia Ringer Stada Hemofarm nu trebuie administrate în acelaşi dispozitiv de perfuzie, datorită riscului de coagulare.

În timpul tratamentului cu Soluţia Ringer Stada Hemofarm există risc de complicaţii determinate de volumul de soluţie şi de cantitatea de electroliti administrate.

Poate să apară supraîncărcare circulatorie cu edem pulmonar, îndeosebi la pacienţii cu risc. În timpul tratamentului cu Soluţia Ringer Stada Hemofarm este necesară supravegherea echilibrelor hidroelectrolitic şi acido-bazic.

Atenţionări speciale
Utilizarea soluţiei necesită supraveghere clinică şi biologică, în special la pacienţii cu insuficienţă renală severă, edeme cu retentie sodată, tratament cu glucocorticoizi şi derivaţi.

Deoarece soluţia conţine potasiu, kaliemia trebuie monitorizată în special la pacienţii cu risc de hiperkaliemie, de exemplu insuficienţă renală severă.

SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi orice alte medicamente.

Această soluţie nu trebuie administrată prin injectare intramusculară. În caz de transfuzii concomitente, sângele şi Soluţia Ringer Stada Hemofarm nu trebuie administrate în acelaşi dispozitiv de perfuzie, datorită riscului de coagulare.

În timpul tratamentului cu Soluţia Ringer Stada Hemofarm există risc de complicaţii determinate de volumul de soluţie şi de cantitatea de electroliti administrate.

Poate să apară supraîncărcare circulatorie cu edem pulmonar, îndeosebi la pacienţii cu risc. În timpul tratamentului cu Soluţia Ringer Stada Hemofarm este necesară supravegherea echilibrelor hidroelectrolitic şi acido-bazic.

Utilizarea soluţiei necesită supraveghere clinică şi biologică, în special la pacienţii cu insuficienţă renală severă, edeme cu retentie sodată, tratament cu glucocorticoizi şi derivaţi.

Deoarece soluţia conţine potasiu, kaliemia trebuie monitorizată în special la pacienţii cu risc de hiperkaliemie, de exemplu insuficienţă renală severă.

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.
Acest medicament poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării, numai dacă este necesar şi sub supraveghere atentă a echilibrelor hidroelectrolitice şi acido-bazice.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Nu este cazul.

3. Cum să utilizaţi SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doze şi mod de administrare:

Doza zilnică maximă se stabileşte în funcţie de vârstă, greutate şi starea clinică a pacientului, precum şi de tabloul biologic al acestuia.

Doza orientativă la adulţi este de 500-1000 ml Soluţia Ringer Stada Hemofarm, în perfuzie intravenoasă lentă, în ritm de 60-70 picături/min; la copii doza se stabileste în funcţie de vârstă şi greutate corporală.

Mod de administrare

Soluţia Ringer Stada Hemofarm se administrează în perfuzie intravenoasă lentă, în condiţii riguroase de asepsie.

Incompatibilităţi

Soluţia Ringer Stada Hemofarm nu trebuie administrată prin acelaşi dispozitiv de perfuzie cu sângele, deoarece există riscul de coagulare, datorită conţinutului în calciu.

Soluţia Ringer Stada Hemofarm nu trebuie amestecată cu soluţii care conţin carbonaţi sau fosfaţi anorganici, datorită riscului de precipitare.

În cazul în care Soluţia Ringer Stada Hemofarm trebuie amestecată cu alte medicamente, este obligatoriu să se verifice compatibilitatea, să se asigure sterilitatea şi uniformizarea amestecului. După realizarea amestecului, acesta trebuie administrat imediat.

Instrucţiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării şi manipularea sa

Înainte de administrare se verifică flacoanele, care trebuie să fie intacte, iar solutia trebuie să fie limpede. Înainte de utilizare trebuie dezinfectat dopul de cauciuc. Nu se utilizează flacoanele deteriorate, ale caror dopuri au fost perforate anterior sau din care s-a extras lichid.

Medicamentul se utilizează imediat după deschiderea ambalajului.

Dacă utilizaţi mai mult Soluţie Ringer Stada Hemofarm decât trebuie

Supradozajul poate determina supraîncărcare lichidiana, dezechilibre hidroelectrolitice, hiperosmolaritate.

Tratamentul constă în întreruperea perfuziei cu Soluţia Ringer Stada Hemofarm şi administrarea de diuretice, de exemplu furosemidă. In caz de oligurie sau anurie pot fi necesare hemodializă sau dializă peritoneală.

Dacă uitaţi să utilizaţi Soluţie Ringer Stada Hemofarm

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Soluţie Ringer Stada Hemofarm

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În condiţiile utilizării conform recomandărilor de mai sus, cu supravegherea atentă a echilibrelor hidroelectrolitice şi acido-bazice, nu există riscul apariţiei nici unei reacţii adverse.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct la
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
Bucuresti 011478- RO
e-mail: adr@anm.ro
Website: www.anm.ro
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.
MEDICAMENTELE EXPIRATE ŞI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM

- Substanţele active sunt: clorură de sodiu, clorură de calciu dihidrat, clorură de potasiu

1000 ml de soluţie perfuzabilă conţin: clorură de sodiu 8,60 g, clorură de calciu dihidrat 0,33 g, clorură de potasiu 0,30 g

Conţinutul în electroliţi:

	g/l	mEq/l
Na^+	3,38	147,10
K^+	0,16	4,00
Ca^{++}	0,09	2,25
Cl^-	5,52	155,60

Osmolaritatea teoretică: 309 mOsm/l

- Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile

Cum arată SOLUŢIE RINGER STADA HEMOFARM şi conţinutul ambalajului

Soluție limpede, incoloră, practic lipsită de particule

Ambalaj colectiv cu 10 flacoane din polietilenă de joasă densitate tip Bottlepack a câte 500 ml soluţie perfuzabilă
Ambalaj colectiv cu 20 flacoane din polietilenă de joasă densitate tip Bottlepack a câte 500 ml soluţie perfuzabilă

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul
Deținătorul autorizației de punere pe piață
STADA HEMOFARM S.R.L.
Calea Torontalului, km.6
Timişoara, Judeţul Timiş, România

Fabricantul[*)]
S.C. STADA M&D S.R.L.
Str. Sfântul Elefterie nr. 18, Parte A, Etaj 1
Sector 5, Cod poștal 050525, București, România

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2026.