

ASCOFER
Comprimate**Compozitie**

Un comprimat conține fer 40 mg sub formă de gluconat feros 378 mg , acid ascorbic 100 mg si excipienti: amidon de porumb, talc, stearat de magneziu, polividona K 30.

Grupa farmacoterapeutică: antianemice, fer bivalent, preparate orale

Indicatii terapeutice

Tratamentul anemiei feriprive datorate:

- tulburărilor absorbției fierului,
- aportului insuficient de fier,
- nevoilor crescute de fier (perioada de crestere la copii si adolescenti, sarcină, alăptare),
- pierderilor crescute de fier (hemoragii, parazitoze, menometroragii),

Profilaxia anemiei feriprive din timpul sarcinii.

Contraindicatii

Anemie normo– sau hipersideremică, talasemia, anemie refractară, anemie prin insuficiență medulară.

Precautii

Tratamentul cu fier trebuie asociat cu tratamentul etiologic al anemiei.

Evaluarea eficacității tratamentului cu fier după 3 luni de administrare se face prin determinarea hemoglobinei, a volumului eritocitar mediu, sideremiei și saturării siderofilinei.

Interactiuni

Nu se recomandă administrarea concomitentă cu preparate injectabile de fier – risc de lipotimie sau șoc prin eliberarea rapidă a fierului din forma sa complexă și saturarea siderofilinei.

Sărurile de fier scad absorbția tetraciclinelor, bifosfonaților (administrați oral), penicilaminei și tiroxinei. Se recomandă administrarea sărurilor de fier după un interval de peste 2 ore față de aceste medicamente.

Sărurile, oxizii și hidroxizii de magneziu, aluminiu și calciu scad absorbția digestivă a sărurilor de fier.

Sărurile de fier scad biodisponibilitatea după administrare orală a fluorochinolonei prin chelare și prin efect nespecific asupra capacității de absorbție din tubul digestiv.

Atenționări speciale

Hiposideremia asociată sindroamelor inflamatorii nu este sensibilă la tratamentul cu fier.

Copii

Nu se administrează la copii mai mici de 6 ani.

Sarcina si alăptarea

Ascofer se poate administra în timpul sarcinii și alăptării.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Ascofer nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze si mod de administrare

Tratamentul anemiei feriprive:

- adulti si adolescenti:

Doza uzuală este de 2 - 5 comprimate *Ascofer* (80 – 200 mg fer) pe zi.

- copii 6-15 ani:

Doza uzuală este de 2 comprimate *Ascofer* (80 mg fer) pe zi

Tratamentul in scop curativ va dura 3 – 6 luni, până la corectarea valorilor hemoglobinei și refacerea rezervelor de fier. Pentru aprecierea eficacității tratamentului se recomandă efectuarea analizelor de laborator după primele 3 luni de tratament.

Profilaxia anemiei feriprive.

Doza uzuală este de 1-2 comprimate *Ascofer* (40 - 80 mg fer) pe zi.

Reactii adverse

Pot să apară tulburări gastrointestinale – greață, constipație, diaree, colorare în negru a scaunelor.

Supradozaj

În caz de ingestie a unei cantități foarte mari de produs pot să apară semne de iritație și necroză gastrointestinală, însoțite de greață, vărsături și stare de șoc.

Tratamentul trebuie început cât mai repede posibil și constă în efectuarea de spălături gastrice cu soluții de bicarbonat de sodiu 1%. De asemenea, se recomandă utilizarea de substanțe chelatoare de tipul deferoxaminei, în special în cazul unei sideremii > 5μg/ml. Se recomandă tratament simptomatic și de susținere.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi între 15-25°C, ferit de umiditate și lumină.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu un flacon a 20 comprimate.

Producător

S.C. ARENA GROUP S.A.

B-dul Dunării nr. 54

Comuna Voluntari, Jud. Ilfov, România

Detinătorul Autorizatiei de punere de piață

SC ARENA GROUP SA

Str. Ștefan Mihăileanu nr. 31, sector 2

București, România

Data ultimei verificări a prospectului

Aprilie, 2007