

**Prospect: Informații pentru utilizator****Diflucan 2 mg/ml soluție perfuzabilă**  
Fluconazol

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Diflucan și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Diflucan
3. Cum să utilizați Diflucan
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Diflucan
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Diflucan și pentru ce se utilizează**

Diflucan aparține unui grup de medicamente denumite “antifungice”. Substanța activă este fluconazolul.

Diflucan este utilizat la adulți pentru tratarea infecțiilor produse de fungi și poate fi folosit și pentru prevenirea infecțiilor candidozice. Majoritatea infecțiilor fungice sunt produse de o levură denumită *Candida*.

**Adulți**

Medicul dumneavoastră vă poate recomanda medicamentul pentru tratarea următoarelor infecții fungice:

- Meningită criptococică – infecție fungică la nivelul creierului
- Coccidiomicoză – o afecțiune a sistemului bronhopulmonar
- Infecții produse de *Candida* și localizate în sânge, organe interne (inimă, plămâni) sau căile urinare
- Candidoza mucoaselor – infecții ale mucoaselor de la nivelul gurii, gâtului și stomatita determinată de proteza dentară

Tratamentul cu Diflucan vă poate fi recomandat și pentru:

- prevenirea reparației meningitei criptococice
- prevenirea reparației candidozei mucoaselor
- prevenirea infecțiilor cu *Candida* (dacă sistemul imun este deficitar și nu funcționează cum ar trebui)

## **Copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani)**

Medicul dumneavoastră vă poate recomanda medicamentul pentru tratarea următoarelor infecții fungice:

- Candidoza mucoaselor - infecții ale mucoaselor de la nivelul gurii, gâtului
- Infecțiile produse de *Candida* și localizate în sânge, organe interne (inimă, plămâni) sau căile urinare
- Meningita criptococică – infecție fungică la nivelul creierului

Tratamentul cu Diflucan vă poate fi recomandat și pentru:

- prevenirea infecțiilor cu *Candida* (dacă sistemul imun este deficitar și nu funcționează cum ar trebui)
- prevenirea reparației meningitei criptococice.

## **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Diflucan**

### **Nu utilizați Diflucan**

- dacă sunteți alergic la fluconazol, la alte medicamente pe care le-ați luat pentru tratarea infecțiilor cu fungi sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6). Simptomele pot include senzație de mâncărime, înroșire a pielii sau dificultăți la respirație.
- dacă luați astemizol sau terfenadină (medicamente antihistaminice pentru tratamentul alergiilor)
- dacă luați cisapridă (un medicament folosit pentru afecțiuni ale stomacului)
- dacă luați pimozidă (un medicament folosit pentru afecțiuni mintale)
- dacă luați chinidină (un medicament folosit pentru tulburări ale ritmului bătăilor inimii)
- dacă luați eritromicină (antibiotic folosit pentru tratarea infecțiilor)

### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Diflucan adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale

- dacă aveți boli de ficat sau rinichi
- dacă aveți boli de inimă, inclusiv tulburări ale ritmului bătăilor inimii
- dacă aveți un dezechilibru al concentrațiilor de potasiu, calciu sau magneziu în sânge
- dacă apar reacții severe la nivelul pielii (senzație de mâncărime, înroșire a pielii) sau dificultăți la respirație
- dacă vă apar semne de “insuficiență corticosuprarenaliană” (oboseală cronică sau de lungă durată, slăbiciune a mușchilor, pierdere a poftei de mâncare, scădere în greutate, dureri abdominale), în care glandele corticosuprarenale nu produc cantități suficiente din anumiți hormoni steroidieni cum este cortizol
- dacă ați dezvoltat vreodată o erupție cutanată severă sau descuamarea pielii, vezicule și/sau răni la gură după ce ați luat fluconazol

Au fost raportate reacții cutanate grave inclusiv reacții la medicament asociate cu eozinofilie și simptome sistemice (DRESS), în asociere cu tratamentul cu fluconazol. Nu mai luați Diflucan și solicitați imediat asistență medicală dacă observați oricare dintre simptomele legate de aceste reacții cutanate grave descrise în secțiunea 4.

Discutați cu medicul sau farmacistul dacă infecția fungică nu se îmbunătățește, deoarece poate fi necesară o terapie antifungică alternativă.

### **Diflucan împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Informați-l **imediat** pe medicul dumneavoastră dacă luați astemizol, terfenadină (medicamente antihistaminice pentru tratamentul alergiilor), cisapridă (un medicament folosit pentru afecțiuni ale

stomacului), pimozidă (un medicament folosit pentru afecțiuni mintale), chinidină (un medicament folosit pentru tulburări ale ritmului bătăilor inimii) sau eritromicină (antibiotic folosit pentru tratarea infecțiilor), deoarece aceste medicamente nu trebuie luate împreună cu Diflucan (vezi secțiunea. “Nu luați Diflucan”).

Unele medicamente pot interacționa cu Diflucan. Informați-l pe medicul dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente, pentru că o ajustare a dozei sau o monitorizare ar putea fi necesare pentru a verifica dacă medicamentele au încă efectul dorit:

- rifampicină sau rifabutină (antibiotice folosite pentru tratarea infecțiilor)
- abrocitinib (utilizat pentru tratarea dermatitelor atopice, cunoscute și ca eczeme atopice)
- alfentanil, fentanil (utilizate pentru anestezie)
- amitriptilină, nortriptilină (utilizate pentru tratarea depresiei)
- amfotericină B, voriconazol (utilizate pentru tratarea infecțiilor fungice)
- medicamente care fluidifică sângele și previn formarea cheagurilor de sânge (warfarină sau alte medicamente asemănătoare)
- benzodiazepine (midazolam, triazolam sau medicamente asemănătoare) utilizate pentru a vă ajuta să dormiți sau pentru tratamentul anxietății
- carbamazepină, fenitoină (folosite în tratamentul epilepsiei)
- nifedipină, isradipină, amlodipină, verapamil, felodipină și losartan (pentru tratarea hipertensiunii arteriale – presiune mare a sângelui)
- olaparib (utilizat în tratamentul cancerului de ovar)
- ciclosporină, everolimus, sirolimus sau tacrolimus (folosite la pacienții cu transplant pentru a preveni respingerea acestuia)
- ciclofosamidă, alcaloizi din Vinca (vincristină, vinblastină sau medicamente asemănătoare) utilizate pentru tratamentul cancerului
- halofantrină (utilizată pentru tratamentul malariei)
- statine (atorvastatină, simvastatină și fluvastatină sau medicamente asemănătoare) utilizate pentru scăderea concentrațiilor mari de colesterol din sânge
- metadonă (utilizată în durere)
- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS))
- contraceptive orale
- prednison (medicament steroidian)
- zidovudină, cunoscut și sub denumirea de AZT; saquinavir (utilizat în infecția cu HIV)
- medicamente utilizate pentru tratarea diabetului zaharat, cum sunt clorpropamidă, glibenclamidă, glipizidă sau tolbutamidă
- teofilină (folosită în tratamentul astmului bronșic)
- tofacitinib (utilizat în tratamentul artritei reumatoide)
- tolvaptan utilizat pentru tratamentul hiponatremiei (niveluri scăzute de sodiu în sânge) sau pentru a încetini scăderea funcției renale
- vitamina A (supliment alimentar)
- ivacaftor (singur sau combinat cu alte medicamente utilizate în tratamentul fibrozei chistice)
- amiodaronă (folosită pentru tratarea bătăilor neregulate ale inimii “aritmii”)
- hidroclorotiazidă (un diuretic)
- ibrutinib (utilizat în tratamentul cancerului de sânge)
- lurasidonă (folosită în tratamentul schizofreniei)

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament.

Nu trebuie să luați Diflucan dacă sunteți gravidă, credeți că ați putea fi gravidă sau încercați să rămâneți gravidă, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră v-a spus acest lucru. Dacă rămâneți gravidă în timpul tratamentului cu acest medicament sau în mai puțin de o săptămână de la ultima doză, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Fluconazolul administrat în primul trimestru de sarcină poate crește riscul de avort spontan. Fluconazolul administrat în doze mici în primul trimestru poate crește ușor riscul ca un copil să se nască cu malformații congenitale care afectează oasele și/sau mușchii.

Puteți continua să alăptați după ce ați luat o singură doză de Diflucan, de 150 mg. Nu trebuie să alăptați dacă luați o doză repetată de Diflucan.

### Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În cazul în care conduceți vehicule sau folosiți utilaje, trebuie să aveți în vedere faptul că pot apărea ocazional amețeli sau convulsii.

### Diflucan conține sodiu (sare)

Diflucan conține 88,5 mg sodiu (componenta principală a sării de masă) per 25 ml. Aceasta este echivalentă cu 4,4% din cantitatea maximă recomandată zilnică de sodiu pentru un adult.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă aveți nevoie să luați Diflucan zilnic o doză de 110 sau mai mulți ml pe zi pentru o perioadă îndelungată, mai ales dacă vi s-a recomandat să urmați o dietă săracă în săruri (sodiu).

## 3. Cum să utilizați Diflucan

Acest medicament vi se administrează de către medicul dumneavoastră sau de către asistenta medicală în perfuzie intravenoasă lentă. Diflucan este furnizat sub formă de soluție. Nu va fi diluat suplimentar. La sfârșitul acestui prospect există informații suplimentare destinate personalului medical.

Dozele recomandate de Diflucan pentru diferite tipuri de infecție sunt prezentate mai jos. Dacă aveți întrebări în privința motivului pentru care vi se administrează Diflucan, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale.

### Adulți

Afecțiune	Doză
Tratamentul meningitei criptococice	400 mg în prima zi, apoi 200 până la 400 mg o dată pe zi, timp de 6 până la 8 săptămâni sau mai mult dacă este necesar. Există cazuri în care dozele pot fi crescute până la 800 mg.
Prevenirea recidivei meningitei criptococice	200 mg o dată pe zi, până când vi se recomandă întreruperea tratamentului.
Tratamentul coccidiomicozelor	200 până la 400 mg o dată pe zi, timp de 11 până la 24 de luni sau mai mult, dacă este necesar. Există cazuri în care dozele pot fi crescute până la 800 mg.
Infecții fungice interne produse de <i>Candida</i>	800 mg în prima zi, apoi 400 mg o dată pe zi, până când vi se recomandă întreruperea tratamentului.
Tratamentul infecțiilor de la nivelul mucoaselor gurii și gâtului și a stomatitei determinate de proteza dentară	200 mg până la 400 mg în prima zi apoi 100 mg până la 200 mg o dată pe zi, până când vi se recomandă întreruperea tratamentului.
Tratamentul candidozei mucoaselor – dozele depind de localizarea infecției	50 până la 400 mg o dată pe zi, timp de 7 până la 30 de zile, până când vi se recomandă întreruperea tratamentului.
Prevenirea reapariției infecțiilor de la nivelul mucoaselor gurii, gâtului	100 mg până la 200 mg o dată pe zi sau 200 mg de 3 ori pe săptămână, atât timp cât există risc de infectare

Prevenirea infecțiilor cu <i>Candida</i> (dacă sistemul imun este deficitar și nu funcționează cum ar trebui)	200 până la 400 mg o dată pe zi, atât timp cât există risc de infectare.
---	--

### Adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani

Respectați doza recomandată de către medicul dumneavoastră (doza recomandată fie pentru adult, fie copil).

### Copii cu vârsta mai mică de 11 ani

Doza maximă recomandată la copii este de 400 mg o dată pe zi.

Doza va fi recomandată în funcție de greutatea copilului exprimată în kg:

Afecțiune	Doză zilnică
Candidoza mucoaselor și infecții la nivelul gâtului produse de <i>Candida</i> – doza și durata tratamentului depind de severitatea și localizarea infecției	3 mg/kg o dată pe zi (se pot administra 6 mg/kg în prima zi)
Meningita criptococică sau infecții fungice interne produse de <i>Candida</i>	6 mg până la 12 mg/kg o dată pe zi
Prevenirea reapariției meningitei criptococice	6 mg/kg corp o dată pe zi
Prevenirea infecției produse de <i>Candida</i> la copii (dacă sistemul lor imun nu funcționează cum ar trebui)	3 mg până la 12 mg/kg o dată pe zi

### Administrarea la copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 săptămâni

Administrarea la copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 4 săptămâni:

- Se recomandă dozele de mai sus, dar administrate la interval de 2 zile. Doza maximă este 12 mg/kg la interval de 48 de ore.

Administrarea la copii cu vârsta mai mică de 2 săptămâni:

- Se recomandă dozele de mai sus, dar administrate la interval de 3 zile. Doza maximă este 12 mg/kg la interval de 72 de ore.

### Vârstnici

Dacă nu aveți probleme cu rinichii, se recomandă aceleași doze ca și la adult.

### Pacienți cu probleme renale

Medicul dumneavoastră vă poate modifica doza, în funcție de starea rinichilor.

### Dacă utilizați mai mult Diflucan decât trebuie

Dacă sunteți îngrijorat că vi s-a administrat o cantitate prea mare de Diflucan, contactați imediat medicul sau asistenta medicală. În cazul unui posibil supradozaj, puteți auzi, vedea, simți sau gândi lucruri care nu sunt reale (halucinații și comportament paranoid).

### Dacă uitați să utilizați Diflucan

Deoarece tratamentul se face sub strictă supraveghere medicală, este puțin probabil ca o doză să fie omisă. Totuși, în cazul în care credeți că o doză a fost omisă, atrageți atenția medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

#### 4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Încetați administrarea cu Diflucan și solicitați **imediat** asistență medicală dacă observați oricare dintre următoarele simptome:

- erupție cutanată răspândită, febră și ganglioni limfatici măriți (sindrom DRESS sau sindrom de hipersensibilitate la medicamente)

Puține persoane pot să manifeste **reacții alergice** la medicament deși reacțiile alergice severe sunt rare. Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Dacă manifestați unul dintre simptomele de mai jos, **spuneți imediat medicului dumneavoastră**:

- respirație șuierătoare brusc instalată, respirație dificilă sau senzație de apăsare în piept;
- umflare a pleoapelor, feței sau buzelor;
- mâncărime generalizată, înroșire a pielii sau apariția de pete roșii, însoțită de mâncărime;
- erupții la nivelul pielii
- reacții severe la nivelul pielii, cum sunt erupțiile cu vezicule (la nivelul gurii și limbii)

Diflucan vă poate afecta ficatul. Simptomele problemelor cu ficatul includ:

- oboseală
- pierdere a poftei de mâncare
- vărsături
- îngălbenire a pielii sau a albului ochilor (icter)

Dacă manifestați unul dintre simptomele de mai sus, opriți administrarea cu Diflucan și **spuneți imediat medicului dumneavoastră**.

#### Alte reacții adverse:

În plus, dacă vreuna dintre următoarele reacții adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reacțiile adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) sunt:

- dureri de cap
- disconfort abdominal, diaree, greață (senzație de rău), vărsături
- creștere a valorilor testelor de sânge care evaluează funcția ficatului
- erupții trecătoare pe piele

Reacțiile adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane) sunt:

- scădere a numărului de celule roșii din sânge, care poate determina paloare a pielii și slăbiciune sau dificultăți la respirație
- scădere a poftei de mâncare
- dificultate de a dormi, somnolență
- convulsii, amețeli, senzație de învârtire (vertij), furnicături, înțepături sau amorțeală, modificări în perceperea gustului
- constipație, digestie îngreunată, gaze, gură uscată
- dureri musculare
- afectare a funcției ficatului și îngălbenire a pielii și a albului ochilor (icter)
- pustule, vezicule (urticarie), mâncărime, transpirație abundentă
- oboseală, stare generală de rău, febră

Reacțiile adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane) sunt:

- scădere a numărului de celule albe din sânge, care luptă împotriva infecțiilor și scăderea din sânge a numărului de celule cu rol în oprirea sângerării
- modificare a culorii pielii în roșu sau purpuriu, care poate fi determinată de scăderea numărului plachetelor sanguine, alte modificări ale celulelor din sânge
- modificări ale testelor de laborator (creștere a concentrațiilor de colesterol sau grăsimi)
- scădere a concentrației potasiului din sânge,
- tremurături,
- modificări pe electrocardiogramă (EKG), modificări ale frecvenței și ritmului bătăilor inimii
- insuficiență hepatică
- reacții alergice (uneori severe), incluzând erupții veziculare generalizate și exfoliere a pielii, reacții severe la nivelul pielii, umflare a buzelor sau a feței
- pierdere a părului

Cu frecvență necunoscută, dar care pot apărea (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

- reacție de hipersensibilizare cu erupție trecătoare pe piele, febră, glande umflate, creșterea unuia dintre tipurile de celule albe din sânge (eozinofilie) și inflamația organelor interne (ficat, plămâni, inimă, rinichi și intestinul gros) (Reacție la medicament sau erupție asociată cu eozinofilie și simptome sistemice (DRESS))

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Diflucan**

- Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
- Nu utilizați Diflucan după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Condiții de păstrare:

- Flacoane din sticlă: A nu se congela.
- Pungi din PVC, plastificate: A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se congela.
- După deschidere, medicamentul trebuie utilizat imediat. Orice cantitate de soluție perfuzabilă neutilizată trebuie aruncată. Acest medicament este numai pentru o singură utilizare.
- Nu utilizați acest medicament dacă observați particule vizibile sau dacă soluția nu este limpede sau prezintă modificări de culoare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Diflucan**

- Substanța activă este fluconazol.
- Fiecare ml conține fluconazol 2 mg.

1 flacon cu 25 ml soluție perfuzabilă conține fluconazol 50 mg.  
1 flacon cu 50 ml soluție perfuzabilă conține fluconazol 100 mg.  
1 flacon cu 100 ml soluție perfuzabilă conține fluconazol 200 mg.  
1 flacon cu 200 ml soluție perfuzabilă conține fluconazol 400 mg.  
1 pungă din PVC cu 100 ml soluție perfuzabilă conține fluconazol 200 mg.  
1 pungă din PVC cu 200 ml soluție perfuzabilă conține fluconazol 400 mg.

- Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile și hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) (vezi secțiunea 2, “Diflucan conține sodiu (sare)”).

### **Cum arată Diflucan și conținutul ambalajului**

Diflucan se prezintă sub forma unei soluții limpezi, incoloră, fără particule vizibile.  
Este furnizat în flacoane din sticlă sau în pungi din PVC, plastificate.

Mărimi de ambalaj:

- 1 flacon conține 25 ml soluție perfuzabilă
- 1 flacon conține 50 ml soluție perfuzabilă
- 48 flacoane ce conțin fiecare 50 ml soluție perfuzabilă
- 1 flacon conține 100 ml soluție perfuzabilă
- 40 flacoane ce conțin fiecare 100 ml soluție perfuzabilă
- 1 flacon conține 200 ml soluție perfuzabilă
- 1, 5, 10, 20 pungă(pungi) din PVC, plastifiată(e) conține(conțin) 100 ml soluție perfuzabilă
- 1, 5, 10, 20 pungă(pungi) din PVC, plastifiată(e) conține(conțin) 200 ml soluție perfuzabilă

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

Pfizer Europe MA EEIG  
Boulevard de la Plaine 17  
1050 Bruxelles  
Belgia

#### **Fabricantul**

Fareva Amboise  
Zone Industrielle  
29 route des Industries  
37530 Pocé-sur-Cisse  
Franța



**Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European și în Maria Britanie (Irlanda de Nord), sub următoarele denumiri comerciale:**

Austria	Diflucan 2 mg/ml Infusionslösung
Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Marea Britanie (Irlanda de Nord)	Diflucan
Cipru, Grecia	Fungustatin
Republica Cehă	Diflucan IV
Franța	Triflucan 2 mg/ml, solution injectable pour perfusion
Germania	Diflucan i.v. 2 mg/ml, Infusionslösung
Olanda	Diflucan I.V. 2 mg/ml, oplossing voor infusie
România	Diflucan 2 mg/ml soluție perfuzabilă
Spania	Diflucan 2 mg/ml solucion para Perfusion

**Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2022.**

-----

Următoarele informații sunt destinate numai medicilor și profesioniștilor din domeniul sănătății:

Perfuzia intravenoasă trebuie administrată cu o viteză care să nu depășească 10 ml/minut. Diflucan în această formă farmaceutică este diluat în soluție perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), cantitatea de soluție perfuzabilă care conține fluconazol 200 mg (flacon a 100 ml) conținând câte 15 mmoli Na<sup>+</sup> și 15 mmoli Cl<sup>-</sup>. Deoarece Diflucan este disponibil sub formă de soluție diluată de clorură de sodiu, la pacienții cu restricție de sodiu sau lichide trebuie luat în considerare acest fapt, atunci când se stabilește viteza de administrare a soluției.

Fluconazol sub forma farmaceutică de soluție perfuzabilă este compatibil cu următoarele soluții perfuzabile:

- a) Glucoză 5% și 20%
- b) Soluție Ringer
- c) Soluție Hartmann
- d) Clorură de potasiu în glucoză
- e) Hidrogenocarbonat de sodiu 4,2% și 5%
- f) Aminofuzină 3,5%
- g) Clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%)
- h) Dialaflex (soluție pentru dializă intraperitoneală 6,36%)

Fluconazolul poate fi perfuzat printr-o cale de abord venos preexistentă în același timp cu una din soluțiile perfuzabile mai sus menționate. Cu toate că nu s-au observat incompatibilități specifice, nu se recomandă combinarea în perfuzie cu alte medicamente.

Soluția perfuzabilă este pentru o singură utilizare.

Din punct de vedere microbiologic, soluțiile diluate trebuie utilizate imediat. Dacă nu sunt utilizate imediat, perioada și condițiile de păstrare sunt responsabilitatea utilizatorului și nu trebuie să depășească 24 de ore la 2 până la 8°C, decât dacă diluarea a fost efectuată în condiții aseptice controlate și validate.

Diluarea trebuie efectuată în condiții aseptice. Înainte de administrare, soluția trebuie controlată vizual pentru a observa eventuale particule vizibile sau modificări ale culorii. Soluția trebuie utilizată doar dacă este limpede și lipsită de particule vizibile.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.