

Lomexin 200 mg capsule vaginale moi
Nitrat de fenticonazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane.

Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Lomexin și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Lomexin
3. Cum să utilizați Lomexin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Lomexin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Lomexin și pentru ce se utilizează

Lomexin conține, ca substanță activă, nitrat de fenticonazol. Acesta are activitate antifungică asupra dermatofitelor (*Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*), *Candida albicans* și altor levuri și antibacteriană asupra bacteriilor Gram pozitiv.

Lomexin este utilizat în tratamentul:

- candidozelor genitale (vulvo-vaginite, cervicite), suprainfectate sau nu cu bacterii Gram pozitive.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lomexin**Nu utilizați Lomexin:**

- dacă sunteți alergic la nitrat de fenticonazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6).
- dacă sunteți alergic la alte medicamente din grupa imidazolilor.
- dacă utilizați prezervative sau diafragme din latex.

Atenționări și precauții

Se recomandă să vă spălați local cu apă și săpun cu pH neutru sau alcalin. Nu utilizați săpunuri cu pH acid, deoarece acesta favorizează proliferarea fungilor.

Se recomandă să aveți în vedere și alte măsuri de igienă (să utilizați lenjerie din bumbac, să evitați dușul vaginal, etc.).

Nu întrerupeți tratamentul în timpul menstruației.

Pentru evitarea recutizărilor, este neapărat necesară eradicarea microorganismului patogen și evidențierea factorilor favorizanți. În acest sens, după confirmarea diagnosticului, se recomandă tratamentul concomitent al ambilor parteneri. Concomitent, trebuie tratate și celelalte focare de candidoză cu alte localizări.

Lomexin împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu trebuie să utilizați prezervative sau diafragme din latex în timpul tratamentului cu Lomexin, deoarece există riscul ruperii acestora.

Nu utilizați contraceptive locale cu efect spermicid, deoarece acestea pot fi inactivate de către orice tratament vaginal.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Alăptare

Dacă alăptați adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a utiliza Lomexin.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Lomexin nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Lomexin conține propil p-hidroxi benzoat de sodiu (E 217). Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate) și, în mod excepțional, bronhospasm.

3. Cum să utilizați Lomexin

Doza zilnică recomandată este de o capsulă vaginală moale Lomexin 200 mg, administrată seara, înainte de culcare, timp de 3 zile. În cazul micozei recidivante sau rezistentă la tratament poate fi efectuată o a doua cură de tratament de 3 zile fie imediat după terminarea celei precedente, fie la interval de o săptămână.

Mod de administrare

Întindeți-vă pe spate, ridicați genunchii și depărtați picioarele, apoi introduceți capsula vaginală moale cât mai adânc în vagin. Spălați-vă întotdeauna pe mâini cu apă caldă și săpun înainte și după administrare.

Utilizarea la copii și adolescenți

Nu se recomandă administrarea Lomexin la copii și adolescenți.

Dacă utilizați mai mult Lomexin decât trebuie

Dacă ați utilizat mai mult Lomexin decât ar fi trebuit, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să utilizați Lomexin

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

De obicei, Lomexin este bine tolerat. Rar, pot să apară manifestări de intoleranță locală precum senzație de arsură sau de exacerbare a pruritului, care se remit în timpul tratamentului. De asemenea, este posibilă apariția reacțiilor alergice.

Tratamentul trebuie întrerupt în cazul apariției manifestărilor de intoleranță locală sau a unei reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Lomexin

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după “EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Lomexin

- Substanța activă este nitratul de fenticonazol. O capsulăvaginală moale conține nitrat de fenticonazol 200 mg.
- Celelalte componente sunt: trigliceride ale acizilor grași saturați, dioxid de siliciu coloidal anhidru, gelatină, glicerol, dioxid de titan (E 171), etil p – hidroxibenzoat de sodiu, propil p - hidroxibenzoat de sodiu (E 217).

Cum arată Lomexin și conținutul ambalajului

Lomexin se prezintă sub formă de capsule vaginale moi, în formă de picătură, de culoare ivorie, conținând o suspensie uleioasă de culoare albă.

Ambalaj

Cutie cu un blister a câte 6 capsule vaginale moi.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Recordati S.P.A.

Via M. Civitali 1, 20148 Milano (MI),

Italia

Fabricant

CATALENT ITALY S.p.A

Via Nettunense Km 20, 100, 04011 Aprilia (LT)

Italia

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2015.