

Prospect: Informații pentru utilizator**Aspimax T 500 mg comprimate**

Acid acetilsalicilic

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile (în cazul febrei) sau 3-4 zile (în cazul durerii) nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Aspimax T și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Aspimax T
3. Cum să utilizați Aspimax T
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Aspimax T
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Aspimax T și pentru ce se utilizează

Aspimax T în doze medii are acțiune analgezică și antipiretică și este indicat pentru:

- combaterea durerilor de intensitate slabă sau moderată, în cefalee, mialgii, dureri reumatice articulare și periarticulare, nevralgii, dureri dentare, dureri din timpul ciclului menstrual;
- combaterea febrei.

Aspimax T este indicat la adulți și adolescenți cu vârstă mai mare de 12 ani și cu o greutate corporală de 40 kg sau mai mare.

Aspimax T conține și carbonat de calciu, un agent de neutralizare a acidității gastrice provocate de acidul acetilsalicilic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Aspimax T**Nu utilizați Aspimax T**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la acid acetilsalicilic, alte antiinflamatoare nesteroidiene, sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- dacă aveți sau ați avut ulcer gastric sau duodenal activ;
- dacă aveți sau ați avut diateză hemoragică (tendință organismului la sângerări repetitive);
- dacă aveți sau ați avut în trecut astm bronșic induc de administrarea salicilaților sau a substanțelor cu acțiune similară, în special antiinflamatoare nesteroidiene;
- dacă aveți insuficiență cardiacă severă (capacitate de pompare scăzută a inimii);

- dacă aveți insuficiență hepatică severă;
- dacă aveți insuficiență renală severă;
- dacă sunteți în ultimul trimestru de sarcină;
- dacă alăptați;
- dacă urmați tratament cu metotrexat în doză mai mare de 15 mg pe săptămână;
- la copii și adolescenți cu vîrstă sub 12 ani sau cu greutate mai mică de 40 kg.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Aspimax T adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă sunteți predispus la alergii; în caz de astm bronșic și alte bronhopneumopatii obstructive cronice, alergie la polen, rinită alergică, polipi nazali, reacții alergice la alte medicamente sau alimente (de exemplu conservanți) tratamentul trebuie instituit numai la recomandarea medicului și sub supraveghere medicală;
- dacă aveți afecțiuni inflamatorii sau ulcerative ale tractului gastrointestinal, inclusiv celul gastroduodenal, colita ulceroasă, boala Crohn; în cazul administrării la pacienții cu ulcer sau sângerări gastrointestinale în antecedente este necesară supravegherea atentă și tratament antiulceros;
- dacă aveți afecțiuni cu risc de sângerare;
- dacă aveți gută - scade eliminarea de acid uric;
- dacă funcția ficatului sau a rinichilor dumneavoastră este afectată ușor până la moderat;
- dacă aveți istoric de hipertensiune arterială și/sau insuficiență cardiacă usoară până la moderată;
- dacă utilizați dispozitive intrauterine ca metodă de prevenire a unei sarcini nedorite;
- dacă sunteți în vîrstă, medicul vă va recomanda utilizarea unor doze mai mici de medicament;
- la copii cu gripă, viroze respiratorii sau varicelă, datorită riscului de complicații infecțioase și sindrom Reye, nu se recomandă utilizarea Aspimax T;
- acest medicament se utilizează sub atenție supraveghere medicală dacă aveți deficit congenital de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază;
- dacă în timpul tratamentului apare hemoragie gastrointestinală (eliminarea de sânge pe gură, prezența sângelui în fecale, fecale de culoare închisă); trebuie să intrerupeți tratamentul și să vă adresați imediat medicului dumneavoastră sau unui serviciu medical de urgență;
- în cazul în care aveți programată o intervenție chirurgicală, chiar dacă este minoră, spuneți-i medicului dumneavoastră, chirurgului sau dentistului că utilizați sau ati utilizat de curând acid acetilsalicilic deoarece acesta crește riscul hemoragic chiar și în cazul utilizării de doze mici și chiar dacă a fost administrat cu câteva zile înainte.

Medicamente precum Aspimax T se pot asocia cu un risc ușor crescut de apariție a atacului de cord („infarct miocardic”) sau a accidentului vascular cerebral. Riscurile de orice tip sunt mai probabile la doze mari și în cazul tratamentului de lungă durată. Nu depășiți doza și durata recomandate de către medic pentru tratament: pentru efectul de ameliorare a durerii (analgezic) și de reducere a febrei (antipiretic) 500 mg acid acetilsalicilic (un comprimat Aspimax T) repetând în funcție de necesități la 4-6 ore.

Dacă aveți probleme cardiace, accident vascular cerebral în antecedente sau considerați că ați putea fi în situație de risc din cauza acestor afecțiuni (de exemplu, dacă aveți hipertensiune arterială, diabet zaharat, valori crescute ale colesterolului sau sunteți fumător) discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Aspimax T împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Se impune prudență în cazul asocierii acidului acetilsalicilic cu următoarele medicamente:

- alte antiinflamatoare nesteroidiene – risc de ulcerații și hemoragii digestive;
- glucocorticoizi – risc de ulcerații și hemoragii digestive;
- anticoagulante orale – risc hemoragic (este necesară monitorizarea timpului de protrombină și ajustarea dozelor);
- heparine – risc hemoragic;
- ticlopidină, clopidogrel și alte antiagregante plachetare – crește riscul hemoragiilor;

- trombolitice (alteplază, streptokinază) – risc hemoragic;
- interferon alfa – acidul acetilsalicilic poate inhiba acțiunea interferonului;
- litiu – crește concentrația plasmatică a acestuia, risc toxic;
- acid valproic – crește concentrația plasmatică a acestuia și riscul efectelor toxice;
- metotrexat, în doze mai mici de 15 mg pe săptămână – crește toxicitatea hematologică;
- digoxină – crește concentrația plasmatică a acesteia și riscul efectelor toxice;
- inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei – risc de insuficiență renală;
- sulfonamide și combinațiile lor – crește toxicitatea acestora;
- uricozurice (de exemplu probenecid), datorită scăderii efectului uricozuric (competiție pentru eliminarea acidului uric la nivelul tubilor renali); se recomandă utilizarea altui analgezic;
- antidiabetice orale – crește riscul hipoglicemiant al antidiabeticelor orale; sunt necesare informarea pacientului și controlul mai frecvent al glicemiei.

Aspimax T împreună cu alcool

Acest medicament nu trebuie administrat împreună cu alcoolul etilic, datorită riscului crescut de leziuni la nivelul mucoasei gastro-intestinale și de creștere a timpului de sângeare.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptăți, credeti că ati putea fi gravidă sau intentionați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

În primele două trimestre de sarcină puteți utiliza acid acetilsalicilic, dar numai la indicația medicului și sub atenta supraveghere a acestuia.

În ultimul trimestru de sarcină acidul acetilsalicilic este contraindicat (cu excepția utilizării punctuale pentru anumite indicații cardioligice și obstetricale foarte limitate).

Deoarece acidul acetilsalicilic trece în lapte și poate provoca astfel sugarului instalarea sindromului Reye, nu utilizați Aspimax T în timpul alăptării sau întrerupeți alăptarea.

Medicamentul face parte dintr-o grupă de medicamente care pot afecta fertilitatea la femei. Acest efect este reversibil la încetarea tratamentului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Aspimax T nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Aspimax T

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți siguri.

Doar pentru administrare orală. Aspimax T trebuie administrat cu o cantitate adecvată de lichid, de preferat împreună cu alimente, în timpul mesei, în cazul persoanelor cu sensibilitate gastrică.

Adulți și adolescenți cu vîrstă peste 12 ani și cu o greutate corporală mai mare de 40 kg:
Pentru efectul analgezic și antipiretic se administreză un comprimat Aspimax T (500 mg acid acetilsalicilic), repetând în funcție de necesități la interval de 4-6 ore.

Doza zilnică maximă este de 6 comprimate Aspimax T (3 g acid acetilsalicilic).

Copii cu vîrstă mai mică de 12 ani și cu o greutate corporală mai mică de 40 kg:
Nu este indicată administrarea la acest grup de vîrstă.

Pentru pacienți vîrstnici (cu vîrstă de 65 de ani și peste):

Doza unică recomandată este de 1 comprimat Aspimax T (500 mg acid acetilsalicilic) și poate fi repetată la un interval de cel puțin 4 ore.

Doza zilnică totală nu trebuie să depășească 4 comprimate Aspimax T (2 g acid acetilsalicilic).

Nu luați acest medicament timp de mai mult de 3 zile (pentru febră), respectiv timp de mai mult de 3 – 4 zile (pentru durere), decât dacă medicul recomandă astfel.

Dacă utilizați mai mult Aspimax T decât trebuie

În caz de supradozaj moderat au fost observate următoarele simptome: zgomote în urechi, diminuarea auzului, dureri de cap, vertij, confuzie.

În caz de supradozaj sever au fost observate următoarele simptome: febră, hiperventilație, cetoacidoză, alcaloză respiratorie, acidoză metabolică, comă, soc cardiovascular, insuficiență respiratorie, scădere severă a concentrației zahărului în sânge.

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă bănuți un supradozaj cu Aspimax T. Medicul va decide ce măsuri sunt necesare în funcție de gravitatea supradozajului.

Dacă uitați să luați Aspimax T

Luați următoarea doză când vă amintiți. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Întrerupeți administrarea și adresați-vă urgent medicului dumneavoastră dacă în timpul tratamentului cu Aspimax T prezentați una dintre următoarele reacții adverse severe:

- reacții alergice precum bronhospasm (în special la pacienții cu astm bronșic);
- porfirie, eritem pigmentar fix;
- fenomenele de iritație gastrică (dureri, arsuri în capul pieptului, vărsături cu aspect de zaț de cafea), scaune de culoare neagră;
- zgomote în urechi, diminuarea auzului, transpirații, amețeli, dureri de cap și stare de confuzie (pot fi semne ale unei intoxicații);
- sindrom Reye.

Medicamente precum Aspimax T se pot asocia cu un risc ușor crescut de apariție a atacului de cord („infarct miocardic”) sau a accidentului vascular cerebral.

În timpul tratamentului cu Aspimax T se pot înregistra următoarele reacții adverse, mai puțin severe:

- sângerări nazale;
- sângerări ale gingiilor;
- purpură (afecțiune caracterizată prin apariția pe piele a unor pete roșii ce nu se decolorează la aplicarea unei presiuni);
- greață;
- vărsături;
- afectarea rinichilor în cazul utilizării de doze mari, pentru perioade îndelungate;
- bătăi rapide ale inimii (tahicardie);
- afectarea ficatului;
- anemie prin deficit de fier.

Tratamentul cu Aspimax T poate determina creșterea riscului hemoragic în cazul unei intervenții chirurgicale.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Aspimax T

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după "EXP:". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Aspimax T

- Substanța activă este acidul acetilsalicilic. Un comprimat conține acid acetilsalicilic 500 mg.
- Celelalte componente sunt: carbonat de calciu, amidon de porumb, povidonă (K 30), talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru.

Cum arată Aspimax T și conținutul ambalajului

Aspimax T se prezintă sub formă de comprimate albe, biconvexe, cu diametrul de 13 mm, având gravat pe una din fețe litera A, iar pe cealaltă față trei concavități ovale dispuse simetric la 120.

Ambalaj

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a căte 8 comprimate.

Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a căte 8 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimele de ambalaj să se comercializeze.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C.LAROPHARM S.R.L

Șoseaua Alexandriei nr.145A, Bragadiru, județul Ilfov

România

Tel/Fax: 021 369 32 01/03/06

e-mail: contact@laropharm.ro

Acetă prospect a fost revizuit în iunie 2015.