

Prospect: Informații pentru utilizator**Piracetam Laropharm 400 mg comprimate**

Piracetam

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Piracetam Laropharm 400 mg comprimate și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Piracetam Laropharm 400 mg comprimate
3. Cum să utilizați Piracetam Laropharm 400 mg comprimate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Piracetam Laropharm 400 mg comprimate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Piracetam Laropharm 400 mg comprimate și pentru ce se utilizează

Piracetam Laropharm 400 mg comprimate aparține unui grup de medicamente numite nootrope. Acest medicament acționează asupra creierului și a sistemului nervos, pe care le protejează în deficitul de oxigenare. Piracetam Laropharm 400 mg comprimate este utilizat împreună cu alte medicamente în tratarea miocloniilor corticale - afecțiune a sistemului nervos ce cauzează contracții musculare involuntare, în special în brațe și picioare.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Piracetam Laropharm 400mg comprimate**Nu utilizați Piracetam Laropharm 400 mg comprimate dacă:**

- sunteți alergic la piracetam, la alți derivați de pirolidonă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- ați avut vreodată afecțiuni renale severe;
- suferiți de boala Huntington (cunoscută, de asemenea, sub numele de coreea Huntington);
- ați avut vreodată hemoragie cerebrală.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Piracetam Laropharm 400 mg comprimate, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă:

- aveți insuficiență renală ușoară sau moderată - este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande să începeți tratamentul cu piracetam cu doze mai mici;
- ați avut vreodată tulburări ale coagulării sângelui.

Piracetam Laropharm 400 mg comprimate împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, în special următoarele:

- extract de tiroidă sau tiroxină;
- anticoagulante precum warfarina sau acenocumarol;

- acid acetilsalicilic în doze mici.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se recomandă utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii și alăptării.

Dacă utilizați Piracetam Laropharm 400 mg comprimate este necesară folosirea unei metode de contracepție. Dacă utilizați Piracetam Laropharm 400 mg comprimate și credeți că ați putea fi gravidă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Piracetamul poate cauza somnolență sau tremurături. Dacă vă simțiți afectat, nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje.

Piracetam Laropharm 400 mg comprimate conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Piracetam Laropharm 400 mg comprimate

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți:

- doza inițială în general recomandată este de 7,2 g piracetam (18 comprimate Piracetam Laropharm 400 mg);
- se recomandă administrarea dozei zilnice în trei doze repetate, a câte 2,4 g piracetam (de exemplu - 6 comprimate Piracetam Laropharm 400 mg dimineața, 6 comprimate Piracetam Laropharm 400 mg la prânz, 6 comprimate Piracetam Laropharm 400 mg seara);
- este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande o creștere treptată a dozei zilnice, până la un control optim al simptomelor dumneavoastră.

Comprimatele se administrează oral, cu o cantitate adecvată de apă.

Nu se recomandă zdrobirea sau mestecarea comprimatelor, deoarece piracetamul are un gust foarte amar. Dacă aveți dificultăți la înghițirea comprimatelor întregi, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Pacienți vârstnici sau cu insuficiență renală:

În cazul în care sunteți un pacient în vârstă (aveți peste 65 ani) sau aveți afectată funcția renală, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande doze reduse față de cele indicate în mod obișnuit la adulți.

Dacă utilizați mai mult Piracetam Laropharm 400 mg comprimate decât trebuie

Dacă ați utilizat mai multe comprimate de Piracetam Laropharm 400 mg decât doza recomandată, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la camera de gardă a celui mai apropiat spital.

Dacă uitați să utilizați Piracetam Laropharm 400 mg comprimate

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Piracetam Laropharm 400 mg comprimate

Nu întrerupeți tratamentul fără recomandarea prealabilă a medicului dumneavoastră. Întreruperea bruscă a tratamentului cu piracetam poate cauza spasme musculare sau convulsii generalizate.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Întrerupeți administrarea acestui medicament și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la camera de gardă a celui mai apropiat spital dacă manifestați reacții alergice precum umflarea feței, limbii și gâtului, dificultăți la respirație, bătăi rapide ale inimii, tensiune arterială mică, erupții pe piele și mâncărimi.

Sunt posibile și următoarele reacții adverse:

- sângerări spontane cauzate de afectarea mecanismului de coagulare a sângelui;
- episoade de agravare a simptomelor tratate;
- halucinații;
- dificultate în menținerea poziției de echilibru sau instabilitate ortostatică (poziția în picioare a corpului);
- anxietate și agitație;
- confuzie;
- neliniște;
- nervozitate;
- somnolență;
- depresie;
- slăbiciune;
- amețeli;
- creștere în greutate;
- dureri de stomac;
- diaree;
- senzație de rău sau stare de rău;
- durere de cap;
- dificultate de a dormi.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Piracetam Laropharm 400 mg comprimate

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Piracetam Laropharm 400 mg comprimate

Substanța activă este piracetam. Fiecare comprimat conține piracetam 400 miligrame.

Celelalte componente (excipienți) sunt celuloză microcristalină, lactoză monohidrat spray-dried, povidonă K30, dioxid de siliciu coloidal anhidru, amidon de porumb, stearat de magneziu, talc.

Cum arată Piracetam Laropharm 400 mg comprimate și conținutul ambalajului

Comprimate de culoare albă, cu diametrul de 12 mm, având gravată pe una din fețe o linie mediană, iar pe cealaltă față 3 arcuri de cerc dispuse simetric.

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C. Laropharm S.R.L.

Șoseaua Alexandriei nr. 145A, Bragadiru, județul Ilfov, România

Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06

e-mail: contact@laropharm.ro

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2017

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>