

Prospect: Informații pentru utilizator**Difrarel 100 mg/5 mg drajeuri**extract antocianozidic din fructe de *Vaccinium myrtillus*/beta-caroten

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Difrarel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Difrarel
3. Cum să utilizați Difrarel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Difrarel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Difrarel și pentru ce se utilizează

Difrarel este un vasculoprotector.

Acest medicament este indicat în:

- tulburări ale circulației venolimfatică,
- fragilitate a vaselor sanguine mici,
- tulburări de vedere de origine vasculară.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Difrarel**Nu utilizați Difrarel:**

- dacă sunteți alergic la extractul din fructe de afin, beta-caroten sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).
- Copii cu vârsta sub 6 ani.

Atenționări și precauții

Se recomandă ca în timpul tratamentului să respectați un regim de viață corespunzător: evitarea expunerii la soare, a căldurii, a statului în picioare, excesului ponderal.

Mersul pe jos și utilizarea de ciorapi medicinali favorizează circulația sanguină.

În cazul în care disconfortul și fragilitatea vasculară persistă, cereți imediat sfatul medicului dumneavoastră.

Difrarel împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Difrelul nu trebuie administrat împreună cu alte medicamente care conțin vitamina A, datorită riscului apariției hipervitaminozei.

Asocierea cu colestiramină, colestipol sau uleiuri minerale și neomicină administrate oral pot să scadă absorbția beta-carotenului.

Doze zilnice mari de beta-caroten (25000 U.I.) pot contracara efectele la nivelul țesutului osos ale tratamentului cu produse conținând calciu, fiind posibilă apariția hipercalcemiei.

Difrelul împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu se cunosc interacțiuni cu alimente și bauturi.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Este de preferat să nu se administreze acest medicament în timpul sarcinii. Dacă aflați că sunteți însărcinată în timpul tratamentului, anunțați medicul, care va hotărî asupra necesității continuării tratamentului. Trebuie să evitați utilizarea acestui medicament în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Difrelul nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Difrelul conține zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Pentru pacienții cu diabet zaharat: un drajeu Difrelul conține zahăr 200,06 mg (mai puțin de 0,1 unități de carbohidrați).

3. Cum să utilizați Difrelul

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este de 3-6 drajeuri pe zi.

Drajeurile trebuie înghițite cu un pahar cu apă, fără a fi sfărâmate în gură.

Tratamentul trebuie efectuat în cure de 20 de zile pe lună; la nevoie, curele se pot repeta.

Dacă uitați să luați Difrelul

Dacă uitați să luați o doză, luați alta imediat ce v-ați amintit. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Difrelul

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În general, medicamentele din plante acționează în timp. Dacă luați Difrelul prea puțin timp, se poate să nu obțineți efectul dorit.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Au fost observate rar cazuri de tulburări digestive.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Difrarel

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Difrarel

- Substanțele active sunt: extract antocianozidic din fructe de *Vaccinium myrtillus* și beta-caroten. Fiecare drajeu conține extract antocianozidic din fructe de *Vaccinium myrtillus* 100 mg și beta-caroten 5 mg.
- Celelalte componente sunt: *nucleu*: Kieselguhr, amestec de zahăr și amidon de porumb, talc, amidon de porumb, stearat de magneziu; *strat de drajefiere*: colofoniu, esență de terebentină, Shellac, gelatină, gumă arabică, talc, sucroză (zahăr), dioxid de titan (E 171), amidon de porumb, albastru patent V (E 131), Opaglos 6000.

Cum arată Difrarel și conținutul ambalajului

Difrarel se prezintă sub formă de drajeuri biconvexe rotunde, de culoare albastră.

Este disponibil în cutie cu un blister din PVC-PVDC/Al a 20 drajeuri.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

BIOCODEX
7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly
Franța

Fabricantul

CENEXI
52, rue Marcel et Jacques Gaucher
94120, Fontenay-sous-Bois
Franța

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2017.