

Prospect: Informații pentru utilizator**Aspamed 39 mg/12 mg comprimate**
Potasiu/Magneziu

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Aspamed și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Aspamed
3. Cum să utilizați Aspamed
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Aspamed
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Aspamed și pentru ce se utilizează

Aspamed face parte din grupa de medicamente numite suplimente minerale, medicamente cu potasiu. Acționează asupra inimii și vaselor de sânge fiind utilizat ca terapie adjuvantă la adulți în boala coronariană (boala vaselor de sânge ale inimii), în anumite tulburări de ritm cardiac și pentru prevenția tulburărilor de ritm cardiac care pot să apară după tratamentul cu unele medicamente numite glicozide tonocardice.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Aspamed**Nu utilizați Aspamed:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6),
- dacă aveți afectare severă a funcției renale (insuficiență renală).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Aspamed, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- dacă aveți insuficiență renală, medicul dumneavoastră vă va monitoriza concentrațiile plasmatiche de potasiu și magneziu;
- în cazul asocierii deficitului de calciu, se recomandă, ca primă măsură, corectarea deficitului de magneziu, înainte de a începe utilizarea de calciu;
- în caz de infecții urinare, acestea trebuie vindecate înainte de începerea tratamentului cu magneziu.

Aspamed împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

În special, informați-l pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist dacă utilizați:

- medicamentele care conțin fosfați sau săruri de calciu, fer, fluoruri,
- chinidină, deoarece poate să apară creșterea concentrației plasmatiche a chinidinei și a riscului de efecte toxice, prin scăderea excreției renale a acesteia, din cauza alcalinizării urinii;
- medicamente utilizate în tratamentul unor infecții (tetraciclină, aminoglicozide);
- cispaltină (utilizat ca antineoplazic),
- ciclosporină A (medicament care scade imunitatea).

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu utilizați Aspamed în timpul sarcinii.

Dacă alăptați, nu luați Aspamed.

Din cauza efectului magneziului de a relaxa musculatura uterină, Aspamed este contraindicat în timpul nașterii.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Aspamed nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Acest medicament conține 39 mg potasiu/comprimat. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu funcție renală diminuată sau la pacienții ce urmează o dietă cu restricție de potasiu.

3. Cum să utilizați Aspamed

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Acest medicament se administrează numai la adulți; doza recomandată este de 1 - 2 comprimate Aspamed administrate oral, de 2 – 3 ori pe zi.

Mod de administrare

Luați comprimatul cu suficient lichid.

Dacă utilizați mai mult Aspamed decât trebuie

Dacă luați mai mult decât trebuie din Aspamed puteți prezenta unele simptome din cauza creșterii concentrației plasmatiche de magneziu sau de potasiu, cum sunt: scăderea tensiunii arteriale, greață, vărsături, înroșirea trecătoare a feței și gâtului, sete, somnolență, confuzie, slăbiciune musculară, diminuarea reflexelor, modificări ale ECG, debutul deprimării respirației, tulburări ale ritmului cardiac, comă, stop cardiac și paralizie respiratorie, anurie (absența urinării). În acest caz, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la cel mai apropiat spital.

Luați comprimatele rămase sau ambalajul gol pentru a ști medicul ce ați luat.

Dacă uitați să utilizați Aspamed

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Aspamed

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Pot să apară:

- greață;
- diaree;
- dureri abdominale;

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Aspamed

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Aspamed

- Substanțele active sunt: D,L-aspartat monopotasice hemihidrat și D,L-aspartat de magneziu tetrahidrat. Un comprimat conține D,L-aspartat monopotasice hemihidrat 180 mg (echivalent cu 39 mg potasiu) și D,L-aspartat de magneziu tetrahidrat 180 mg (echivalent cu 12 mg magneziu).
- Celelalte componente sunt: Amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal anhidru, talc, stearat de magneziu, celuloză microcristalină pH 101.

Cum arată Aspamed și conținutul ambalajului

Aspamed se prezintă sub formă de comprimate rotunde, de culoare albă până la aproape albă, cu diametrul de 12 mm, inscripționate cu litera P pe una din fețe.

Cutie cu 5 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

ARENA GROUP S.A.
Str. Ștefan Mihăileanu nr.31, cod 024022, sector 2 București,
România

Fabricant

ARENA GROUP S.A.
Bulevardul Dunării nr.54, Oras Voluntari,
cod 077190, jud. Ilfov,
România

Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2020.