

PROSPECT: Informații pentru utilizator**USCOSIN 10 mg supozitoare**
Bromura de N-butilscolopolamoniu

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect :

1. Ce este **USCOSIN** și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați **USCOSIN**
3. Cum să utilizați **USCOSIN**
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează **USCOSIN**
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este USCOSIN și pentru ce se utilizează

USCOSIN se folosește ca medicație simptomatică în caz de:

- afecțiuni spastice gastro-intestinale, biliare și urogenitale;
- Colici diverse (de exemplu colică renală, colică biliară), spasme uterine, cistită, dismenoree.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați USCOSIN**Nu utilizați USCOSIN**

- dacă sunteți alergic la la bromura de N-butilscolopolamoniu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament(enumerate la punctul 6) ;
- în caz de miastenia gravis;
- în caz de megacolon;
- dacă aveți stenoză pilorică;
- dacă aveți glaucom cu unghi închis;
- dacă aveți tulburări uretro-prostatice cu risc de retenție urinară;
- la copii.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați **USCOSIN**, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă aveți reflux gastroesofagian, aveți grijă când utilizați **USCOSIN** deoarece administrarea sa poate agrava afecțiunea prin inhibarea peristaltismului gastric și relaxarea cardiei.

Dacă aveți glaucom cu unghi deschis, se recomandă prudență când utilizați **USCOSIN**.
În cazul în care aveți mai mult de 40 ani, se recomandă prudență când utilizați **USCOSIN**, datorită existenței riscului agravării unui glaucom nedignosticat.

Dacă suferiți de tulburări obstructive gastro-intestinale sau colită ulceroasă, se recomandă prudență dacă utilizați **USCOSIN** deoarece dozele mari de parasimpatolitice inhibă peristaltismul intestinal și pot să provoace ileus paralytic sau megacolon toxic.

Dacă suferiți de tahiaritmii, insuficiență cardiacă congestivă, angină pectorală și stenoză mitrală, se recomandă prudență dacă utilizați **USCOSIN** deoarece medicamentul poate provoca creșterea frecvenței cardiace ceea ce ar agrava aceste boli.

Dacă aveți insuficiență hepatică și renală sau suferiți de hipertiroidie, se recomandă prudență când luați **USCOSIN**.

USCOSIN împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați , ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

În special este important să menționați:

- dacă luați anticolinergice;
- dacă luați metoclopramida;
- dacă luați analgezice opioide;
- dacă luați medicamente deprimante ale sistemului nervos central;
- dacă luați medicamente simpatomimetice β_1 – adrenergice;
- dacă luați medicamente cu efecte anticolinergice (antidepresive triciclice, antihistaminice H_1 , chinidină, disopiramidă, amantadină);
- dacă urmează să luați pentagastrină și histamină.

În cazul utilizării **USCOSIN** conform recomandărilor, este puțin probabil să apară interacțiuni medicamentoase.

USCOSIN împreună cu alimente , băuturi și alcool

Nu se recomandă asocierea **cu alcool** a tratamentului cu **USCOSIN**

Sarcina , alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Folosirea **USCOSIN** în timpul sarcinii se face cu prudență și numai după evaluarea de către medicul dumneavoastră a raportului beneficiu matern-risc potențial la făt.

Folosirea **USCOSIN** pe perioada de alăptare este contraindicată.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Folosirea **USCOSIN** poate avea ca efect apariția tulburărilor de acomodare vizuală.

3. Cum să utilizați USCOSIN

Utilizați întotdeauna **USCOSIN** exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur .

Doza recomandată este:

Adulți: doza recomandată este de 1 supozitor **USCOSIN** administrat rectal, de 3 - 4 ori pe zi.

Dacă utilizați mai mult USCOSIN decât trebuie

Dacă ați luat mai multe doze **USCOSIN**, decât trebuie, întrerupeți administrarea și contactați imediat medicul dumneavoastră sau adresați-vă celui mai apropiat spital.

Dacă uitați să luați USCOSIN

Luați doza recomandată imediat ce va amintiți.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, **USCOSIN** poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse, ușoare și tranzitorii care pot să apară, sunt comune tuturor parasimpatoliticilor:

- uscăciunea gurii;
- constipație;
- tahicardie;
- creșterea presiunii intraoculare
- retenție urinară;
- tulburări de acomodare vizuală;
- confuzie mentală, în special la vârstnici;
- reacții cutanate, foarte rar;
- dispnee, excepțional.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează USCOSIN

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați **USCOSIN** după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.

Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține USCOSIN

- Substanța activă este: bromura de N - butilscolamoniu. Un supozitor conține 10,0 mg bromură de N -butilscolamoniu.
- Celelalte componente sunt: parafina lichidă; gliceride de semisinteză și dioxid de siliciu coloidal anhidru.

Cum arată USCOSIN și conținutul ambalajului

USCOSIN se prezintă sub formă de supozitoare în formă de torpilă, cu suprafața netedă, omogenă în secțiune.

Medicamentul este ambalat în cutii cu:

- 2 folii termosudate din PVC/polietilenă a câte 3 supozitoare;
- 2 folii termosudate din PVC/polietilenă a câte 5 supozitoare.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C. SINTOFARM S.A. ROMÂNIA

Str. Ziduri între Vii, nr. 22,
sector 2, 023324, București,
România
Tel.: 021-2521715;
E-mail: office@sintofarm.ro
Fax: 021-2522441;

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2015